



醫學入門
四巻上



編註醫學入門 四卷上

雜病提綱

雜病分類



編註醫學入門外集卷之四

丹溪朱先生　雜病纂要　詳於格致餘論局方發揮丹溪心法纂要只用醫按及今附餘併各名家方書如巢氏病源好生書儒醫精要惜乎未之見也

△雜病提綱　外感　風　寒　暑　濕　燥　火
內傷脾胃氣血痰鬱積熱諸虛痛冷

○外感

○風　頭眩　頭痛　面風　眼　耳　鼻
口舌　牙齒　癘風　痺風　斑疹　遊風

中風卒倒分真似　風爲百病長善行數變爲卒中昏倒爲竄視喎斜爲搐搦反張或爲寒中或爲熱中或爲癘風入陽經則狂入陰經則癲入皮膚則痒入筋則攣急入骨節則疼痛入肉分與衛氣相搏則不仁與榮氣相搏則半身不遂入經癱瘓入絡脣頰入腑即不識人入臟即舌強吐沫挾熱則痿緩挾寒則拘攣挾濕則腫

滿有真中者有兼中似中者陽病身熱陰病身凉烏附行經不可緊用

口眼喎斜語話難 風邪初入反緩正氣反急牽引口眼喎僻或左或右急搯人中拔頂髮灸耳垂珠栗米大艾三五壯外用南星草烏各一兩白芨一錢姜蠶七枚為末姜汁調塗喎處正即洗去內用正舌藥白附子姜蠶全蝎等分為末酒調服二錢○不語有數端有風中心脾者資壽解語湯有風中心經者小續命湯去桂附加菖蒲有痰塞心竅者導痰湯加菖蒲人參竹茹或芩連有舌本強硬語言不正者用蝎稍二錢半茯苓一兩薄荷二兩為末酒調服二錢或擦牙尤妙又有風熱癃者有血虛氣虛者有腎虛及老人忽言不出者十全大補湯去桂加菖蒲遠志

痰塞喉中聲噫嘻 同上卒倒歪斜不語名風癔身軟有汗者生汗不出身直者死痰由水化制火閉塞心竅不語熱者凉膈散加黃連或牛黃清心丸虛者星香散二生飲導痰湯小省風湯

半身或只一肢**不遂** 此名偏枯言不變智不亂病在膚腠之間溫臥取汗

四肢癱瘓 此名風痱智亂不能言者難治其症身體無痛緩則四肢不舉

急則一身皆仰或左癱右瘓或一臂不隨時復轉移一臂
祛風化痰調氣養血爲主換骨丹黒虎丹神仙飛步丹有
脾實者膏粱之疾非肝腎虛痿搜風順氣丸有
脾虛者十全大補湯獨活寄生湯萬寶回春湯又有五痺
類風狀見後四症風癔風痱偏枯痺風全無莫浪猜中暑中寒中濕痰厥氣厥食厥熱厥
虛暈等症皆卒倒不語但風必有歪斜搐搦之症爲異雖
内傷兼中亦然但四症見一便作風治惟有輕重緩急之
分輕者發過如故或口舌無恙手足顫拽者大省風湯加
人參沒藥等分水煎熱服得汗即愈或四肢無恙口喎語
澁者古防風湯入麝一丁臺調服或自
醒能言能食惟身體不遂者地仙丹西北風高眞中宜分治
東南地濕兼中似中審實虛主火河間主氣東垣或主濕丹溪内傷兼
中似中盡相須三子所主雖殊而實同也況濕則中氣不運而生痰痰因火動而生風又兼二子之
見也氣衰賊邪容易襲氣血壯盛腠理緻密邪不能入惟中年氣血始衰腠理空疎加以七情勞

殺飮食内傷元氣門巻賊風乗虚襲入臟腑血脉故有兼中者東垣所謂非外邪徑傷乃本氣病也有醉後當風頭面多汗善渴者名曰漏風宜黄芪六一湯加參朮牡蠣乾葛有房労中風下體多汗曰内風十全大補湯加附子防風加入風府曰腦風入係頭曰目風在腠理爲洩風與漏風同但身盡疼耳久則爲腸風食後曰胃風又名夾食中風久則爲下血有傷食變爲暴厥亦類中風但停食則胷中滿悶須探吐及理脾胃有酒濕病亦類中風當分消以瀉濕毒有内傷熱症似中風者有雜病厘症似中風者均不可以風治

火動氣中無涎汚

中氣脉沉身凉無痰涎爲異耳如思慮肉脫憂愁肢廢悲哀筋攣過喜皮槁盛怒腰脊即汗潤所謂將息失宜五志過極則心火暴甚腎水難制熱氣拂鬱昏倒筋骨不用久則攤瘓忌服風藥宜藿香正氣散合星香散虚者八味順氣散實者四七湯

眞中中腑着四肢

手足拘攣或中身前身後身側可治脉浮有表面見五色惡寒宜小續命湯或排風湯風從汗散通因通用是也如脉浮不語者用防風黄芪煎水一抯置床下薰入鼻中良久能

言進藥中臟閉塞九竅多皆危中臟之絡者口眼俱閉可治如入臟深者心絕口開肝絕眼閉脾絕手散肺絕痰如拽鋸腎絕遺尿或大吐大瀉下血吐血者皆死宜三化湯搜風順氣丸麻子仁丸凡攻裏忌腦麝牛黃引風入骨芫花芽遂損傷氣血如汗多尿少者忌滲利葉竭無以制火煩熱愈甚候熱退汗止小便自利

中血脉絡也則歪口眼或迸於腑外亦有六經形症則從小續命湯加減微汗或迸於臟內亦有便溺阻隔則從三化湯加減微利

又有中經亦要知內無便溺阻隔外無六經形症從中治不可汗下蓋風本於熱熱勝則風動宜養血以勝燥大秦艽湯分經加減或天麻丸羌活愈風湯如欲微汗愈風湯加麻黃欲微利愈風湯加大黃中腑雖宜汗汗多則亡陽中臟雖宜下下多則亡陰若臟腑兼見者或先汗而後利或表裏兼攻者防風通聖散

口不能言肢不持手足不能運動乃血弱不能營筋與舌也

左為死血留滯經絡與少血四物湯少加防風羌活主之瘀血加桃仁

紅花

痰與氣虛身右居　血虛則痰火流注於左而爲癱氣虛則痰火流注於右而爲瘓急治則愈久則痰火鬱結難治痛者爲實先以二陳省風之類治痰後以防風通聖散瀉青丸之類瀉火不痛爲虛血虛者四物湯倶姜汁炒過加竹瀝姜汁肥人濕痰少加附子行經瘦人火動加黃栢氣虛者四君子湯虛甚遺尿聲鼾睡者濃煎參芪加附子姜汁勞傷者補中益氣湯加竹瀝兼治右瘓痰盛者二陳湯加姜汁竹瀝能食者換荊瀝此丹溪雜病通法也

通治南北開關化涎沫　開關散吹鼻有嚏可治無嚏者死不關緊急入藥不得者用南星五分龍腦一字端午日午時合每用一字至五分擦牙熱自開痰甚者宜量虛實吐之虛者稀涎散微微吐出冷涎實者用瓜蒂炒黃末五分或一錢入全蝎末半分吹入鼻中立吐如不吐用酸虀汁調下如再不吐用熱虀汁投之此藥不可輕用吐後宜服降火利氣安神定志之藥吐法見傷寒但中風大吐涎出久則手足骨節皆枯不能轉動滑利以藥壓下再歸骨節可也小兒驚搐亦然

順氣活血風自祛　風症皆痰爲患故治

以開關化痰為先急則祛風緩則順氣久則活血如真氣漸復痰飲漸消或尚有風邪未退羌活愈風湯調之實者川芎茶調散虛者萬寶回春湯未可全以風治也抑論舊以西北風高真中宜分臟腑經絡調治東南地濕兼中似中宜分氣血虛實痰火多少調治然真中兼中南北互有且治臟腑者可不分氣血之虛實乎治氣血者又可不分臟腑經絡之邪多少乎大抵外感重而內傷輕者先須分表裏法祛風為主次用氣血痰法調治內傷重而外感輕者先用調補氣血痰法為主次分臟腑經絡祛風此活法也

若覺膚頑肌蠕動

凡覺手足麻木肌肉蠕動如有虫行心神憒亂宜烏藥順氣散如眉稜骨痛者風之兆也宜古防風湯加芩連

預防之法亦甚推

禦風丹五參散史國公浸酒方單豨薟丸

冒風惡風多屬肺

肺主皮毛通膀胱最易感冒新咳嗽惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒月麻黃杏仁飲重者頭疼身痛寒熱咽乾音啞柴胡桂枝湯防風沖和湯頭痛甚者川芎茶調散痰多者金

沸草散挾熱人參敗毒散升麻葛根湯挾寒十神湯挾寒濕消風百解散挾濕神朮散挾暑香葛湯時行柴胡升麻湯

挾內慎勿專攻外 聲重咳嗽外感則甚者防風通聖散或大黃黃芩等分爲丸白水下素虛者只用防風羌活川芎隨宜加入補藥痰藥中傷食加白朮陳皮青皮山查麥芽挾形寒飲冷加姜桂挾房勞加參朮歸地挾勞役傷氣者補中益氣湯加羌活防風 風虛甚者羌活丸加味烏荊丸

重則傳變輕不傳 風重傳裏下同傷寒治法

久甚能爲氣血害 風能燥血散氣故古用桂附八物等湯久不愈者只宜二自湯加減斂之切忌躁泄雖初起非寒月無汗麻黃禁用

○寒 咳嗽 霍亂 心脾痛 腹痛

中寒無汗肢僵仆 傷寒循經漸入中寒不問冬夏或當風坐臥或坐地受冷肅殺之氣自皮膚卒入臟腑昏倒四肢拘攣強直厥冷與中風相似牙緊閉股不動爲異耳急用葱餅熨臍并灸氣海手足温煖則生如

搐冷唇青厥逆無脉舌卷囊縮者須臾郎死**急分三陰煖下元**倉卒難分經絡急煎姜附理中救之次審中脘疼痛中太陰者理中湯脉沈足冷中少陰者四逆湯加呉茰或臍腹疼痛五積散加呉茰小腹疼痛中厥陰者當歸四逆湯加呉茰或五味子如陰盛煩燥熱藥冷飲或加些凉藥爲引温中散冷補煖下元陽氣復而寒自消矣切忌吐下方兼補血者寒渋血故也**感冒尋常和表裏**西北苦寒中傷者多東南温和中傷者少尋常感冒表症見者九味羌活湯芎芷香蘇散寒入腸胃者霍亂轉筋洞泄下利乾嘔吐逆藿香正氣散或五積散挾食停痰者人參養胃湯夏秋暴寒抑熱於裏者調中湯微下之凡帶漏遺精痿癱瘡瘕脚氣腰膝冷虛勞陰萎諸痛皆寒所爲也挾風眩暈不仁挾濕四肢腫痛**内傷補益加辛温**内傷勞役感寒困倦補中益氣湯加姜附如内傷生冷感寒腹痛脉脫附子理中湯如内傷房室感寒厥冷四逆湯脉脫二建湯煉臍法

○**暑** 霍痢

暑熱汗渴審實虛 暑病身熱自汗口渴面垢而已餘症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛弱或太病太勞後縱暑中傷者宜清暑益氣素強盛壯實無虛損病者宜祛暑和中

陰陽經絡最難拘 靜居高堂大廈得病似熱症屬心脾經者名中暑陰症動作由野道途得病似傷風症屬膀胱經者名中暍陽症其實一也但夏襲暑氣而得曰中暑夏被日逼而得曰中暍然暑初入自口鼻牙頰達手心主胞絡以火從火故古法祛暑取冷水灌溉勿熱入肝則肢暈頭麻入脾則昏瞶一不覺入肺則喘咳痿躄入腎則消渴非專心主而無傳入也

中緊**傷**緩**冒**淺**伏**深**分輕重** 中暑歸心神昏卒倒傷暑肉分周身煩燥或如鍼刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌表也冒暑入腸胃腹痛惡心嘔瀉伏暑即冒暑久而藏伏三焦腸胃之間熱傷氣而不傷形旬月莫覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿瘧痢煩渴腹痛下血等症但暑病多無身痛間有痛者或為澡浴水濕相搏耳

暑風暑厥又何如 即暑暍症但以手足搐搦為風手足逆冷

刺血法見七卷首
古西叢絞腸砂
條下

爲厥厥與傷寒熱厥義同黃連香薷散暑風乃勞役內動五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香茹散加羌活或六和湯合消風散素有痰飲因暑觸動痰熱生風若六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫難治急扶陰凉處不可卧濕冷地掬道上熱土放臍上撥開作竅令人尿於其中待求生姜或蒜嚼爛以熱湯或童便送下外用布蘸熱湯熨氣海立醒後尤不可飲冷水以朮劑滋補藥服之如心神恍惚用五苓散燈心同煎入硃砂末調服有汗加黃芪因酒引暑入腹尿血者去桂加黃連或神昏驚悸妄言用益元散量加硃砂新汲水調服二錢降胃火治煩熱利濕止渴之要藥

痰火絞腸俱可吐 暑毒痰火窒塞胸中量體虛實吐之火鬱發之之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調麝二釐服○絞腸砂腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞縮在腹須臾能死急用熱湯調鹽一兩灌入卽安或用陳艾陳樟木陳壁土各等分水煎連進三四服或刺血法見急救

袪暑和中利濕消導其雜**症自除** 夏月人多飲冰食冷故宜利湿兼以消導

汗多者忌滲○祛暑香茹散、黄連解毒湯、清肺生脉散、白
虎湯加參、柴。寒熱不定、小柴胡湯。○和中、大小調中湯、茹
苓湯、枇杷葉散、胃苓湯、
桂苓甘露飲、六和湯。
寒鬱甚者須反治
伏陰在内之時、
避暑貪涼、外又
襲陰冷之氣、鬱遏周身陽氣、宜辛温解散、茹藿湯之類。若
外既受寒、内復傷冷、加乾姜、砂仁、神麴、參。若外觸暑氣、内傷
冷食、以致外熱内寒、宜清暑益氣湯。若外不受寒、止是内
傷生冷、腹脹痛嘔瀉、宜理中湯、加麥芽、砂仁。或大順散、或二
氣丹、冷水下卅丸。皆治因暑傷冷、非温散治
暑之謂也。誤服發黄發斑、蓄血悶亂而死。
内傷滋補免
清癯
内傷勞役、或素稟氣血虛弱、病暑者、一以滋補爲主、慎
用大熱太凉之劑。暑重尿赤者、清暑益氣湯。暑輕力
倦者、補中益氣湯、或爲丸。中暍暫加香
三伏炎蒸尤可畏
茹藿豆。陰虛者、滋陰降火湯、腎氣丸。
大熱傷氣、養生家謂此時、縱酒恣色、令
人内腎腐爛、至秋方疑、甚則化水而死。
預防不獨羨香茹
時常御暑體實者、香茹散、益元散。虛者忌用、蓋脾虛者不
必因暑勞役、及乗凉致病、毎遇春末夏初、頭疼脚軟、食少

體熱各注夏病宜補中益氣湯去升柴加黃栢芍藥五味子麥門冬有痰加半夏姜汁實三伏鄒暑之聖藥也如氣虛精神不足煩渴懶食者生脈散誘行丸通用謝傳萬病無憂散

○濕 痞滿 泄瀉 吞酸 黃疸 水腫
脹滿 赤白濁 腰痛 疝痛 脚氣

濕氣屬體分內外 風寒暑濕傷人便覺濕氣薰襲人多不覺有自外入者長夏鬱熱山澤蒸氣冒雨行濕汗透沾衣多腰脚腫痛有自內得者生冷酒麪滯脾生濕鬱熱多肚腹腫脹西北人多內濕東南人多外濕

內外又分上下中 濕在上宜微汗在中下宜利二便或升提

初入身沈重多困倦 或肢節痛或一身盡痛甚則濕聚為痰昏不知人為直視為鄭聲

上薰喘欬目如蒙 首位高氣清濕薰則如有物以蒙之也單蒼朮膏茯苓湯

着脾浮貞腫脹滿或臍下硬退黃丸大便泄 朮附湯二白湯滲濕湯

着腎脚腰小便濃 濕下先受之故腰脚攣痛獨活寄生湯當歸拈

痛瀉腎著湯青娥丸治外微汗通經絡微汗防已黄芪湯或羌活勝濕湯無汗者五苓散加蒼朮通經絡神仙飛步丹乳香黒虎丹治內滲小便利大便爲妙上滲劑五苓散黄加茵陳一倍身痛加羌活一倍濕盛腫脹者又當以車前木通葶藶利水行氣爲君而以參朮茯苓爲佐或以二朮爲君而以利水藥爲佐濕鬱肢脹或遍身浮腫者皆自内而出也量虚實利之不敢利者退黄丸妹四氣相兼蒹中兼感濕熱甚除濕湯兼風合桂枝湯或古防風湯敗毒散兼寒合五積散或古羗附湯兼暑合五苓散大抵百病兼風則必惡風有汗眩暈兼寒則必惡寒無汗或攣痛兼暑則必面垢煩渴兼濕則必腫滿沉倦四氣互相兼併惟寒濕濕熱爲病濕熱尤多以尿赤有渴爲濕熱多黒瘦膏粱之人以便清不渴爲寒濕多肥白淡食之人昔有專用五積治寒濕防風通聖散治濕熱宜哉清熱燥濕兼補中此治濕熱法也凡内傷勞役七情飲食以致脾虧火動肺金受傷則木旺侵脾令飲食不化鬱爲痰積甚則腹脹浮腫實者下之虚者補脾利濕消導兼

以清熱滲濕湯是也濕熱勝筋痿熱勝筋縮者尤宜

通用內外濕熱**燥脾并升散**燥脾枳朮丸大安丸單蒼朮丸升陽除濕湯通用二陳湯或平胃散加桑白皮爲主濕在上焦加羌活蒼朮微汗有熱加黄芩中焦濕加猪苓澤瀉滲利熱加黄連下焦濕加升麻防風升提熱加防己黄栢龍膽草肥人多濕加蒼朮滑石瘦人多熱加芩芍流困加參朮又四製蒼栢丸二精丸

實者大使方可攻元氣實而濕熱甚者導水丸或除濕丹舟車丸

○燥 消渴 燥結

燥有內外屬陽明外因時值陽明燥令久晴不雨黄埃蔽空令人狂惑皮膚乾枯屑起內因七情火鬱或大病吐利亡津或金石燥血或房勞竭精或饑飽勞逸損胃或炙煿酒醬厚味皆能偏助火邪消爍血液

總來金被火相刑六氣風熱火屬陽寒燥濕屬陰但燥雖屬秋陰而反同風熱火化蓋火盛則金

被熱傷木無以制而生風風勝濕熱耗津入肝則筋脉動
強瞼急口禁發爲風癇或手足癱瘓偏枯或十指皮膚莫
能搔痒或爲雀目內障入心則昏冐偃仆語言蹇澁入脾
則膈滿不食或善饑而瘦或傷積變爲水腫腹脹入肺則
毛焦乾痒膹鬱咳嗽入腎則津液竭而煩渇及皴勁渇秘
骨蒸秘結總皆肺金所主陽明與肺爲表裏也
雖風熱表裏俱宜潤衛榮 表病皮膚皴揭四物湯去川芎
合生脉散加知栢天花粉或单
天門冬膏如筋攣不能運動者大秦艽湯 ○裏病消渇活
血潤燥生津飲 ○燥結因肝木自旺或肺風入大腸者日
風燥搜風順氣丸因臟腑積熱或久病鬱熱者日熱燥四
順清凉飲當歸龍薈丸因脾胃伏火便閉不食者日血燥
四物湯加大黃桃仁或爲丸服大便偏秘者導滯通幽湯
小便偏秘者導氣除燥湯陰虛火燥者日虛燥单黃栢丸
補陰丸腎氣丸勞役氣虛燥者補中益氣湯通用四物湯
去芎爲君天麥門冬爲臣瓜蔞爲佐升麻紅花甘草爲使
風加秦艽或牛膝熱加黃芩血佸生地渇加天花粉五味
子閉結加大黃郁李仁氣虛量加參芪腎虛加知栢

火

大抵宜甘寒潤劑忌辛香動火及一切發汗之藥經曰燥者潤之養血之謂也蓋燥則血澁而氣液爲之凝滞潤則血旺而氣液爲之宣通由內神茂而後外色澤矣然積液固能生氣積氣亦能生液常用氣虛者瓊玉膏津虛者單五味子膏血虛者地黃膏凡病過不燥亦宜量加此等潤劑

○脇痛　夢遺　淋　小便不通

○火　小便不禁　脱肛

火因內外分虛實　外因邪鬱經絡積熱臟腑此爲有餘之火內因飲食情慾氣盛似火此爲有餘中不足陰虛火動乃不足之火大要以脉弦数無力爲虛火實大有力爲實火

性暴無常主病多　火病死人甚暴變化無常一動便傷元氣偏勝移害他經内經病機十九條而屬火者五劉河間推廣五運爲病屬肝者諸風之火屬脾胃者諸濕痰火屬心肺者諸熱實火屬腎者諸虛之火散於各經浮遊之火入氣分無根之火入血分消陰伏火故曰諸病寻痰痰火生異症

實火渴閉熱無間　實火內外皆熱口渴日夜

潮熱大小便閉虛熱有間口無荷虛火潮熱有間口燥不渴瀉實補虛升且降
實火因外感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯
入裏大承氣湯燥渴白虎湯因金石炙煿者黃連解毒湯
防風當歸飲三黃丸大金花丸狂者黑奴丸○虛火氣虛
火盛因勞倦傷胃無力身熱宜保元湯補中益氣湯加芍
藥黃栢或四君子湯滲之如大病及吐瀉後身熱如焚命
門脉脫爲陽衰之病宜以辛熱溫養其火則熱自退附子
理中湯霹靂散主之○血虛火動因傷色慾午後發熱宜
四物湯滋陰降火湯加味逍遙散腎氣丸人中白散甚者腎
木受傷生也玄參煎膏主之相火狂甚氣從臍下起者正
氣湯坎離丸死氣從湧泉穴起入腹者虛極難治四物湯
加白馬脛骨降陰火以代芩連或人中黃亦好外用附子
末津調塗足心亦有濕熱鬱者○飲食鬱火因內傷生冷
及飲食不化抑遏陽氣於脾土四肢熱如燎以升散之劑
發之升陽散火湯火鬱湯滋陰升陽湯○七情五志火
甚宜隨各經調之大怒火起於肝則手掉目眩清肝湯加
龍膽草古柴連丸醉飽火起於胃則痞塞腫痛瀉黃散戊

已丸、单石斛丸。悲哀火起於肺、則氣随胸鬱、瀉白散加黄芩、葶藶、单黄芩丸、单苦參丸。房勞火起於腎、則骨蒸潮熱、大補陰丸、滋腎丸、单黄栢丸。心火輕則煩熱痛痒、单瀉心湯。重則自焚、面青發躁、脉絶暴死。故曰五志之火動極不治。○總論虛火可補、實火可瀉、輕者可降、重者従其性而升之。君火正治、可以濕伏、可以水滅、可以直折。相火反治、不可以水濕折、惟従其性而伏之。即如實火發狂、宜三黄解毒、正治。虛火發狂、先與姜湯、然後補陰、其火自降。凡火盛、不可猛用凉藥、必酒炒過、或兼温散

君相民皆静且和

升發。又有可發汗者、風寒生冷鬱也。五行惟火有二。心為君火、一身之主。腎為相火、遊行於身、常寄肝膽胞絡三焦之間。又膀胱為民火、亦属於腎。此皆天賦不可無者。若五志之火、則由於人。是以内傷火多、外感火少。慮火不妄動、動由於心。静之一字、其心中之水乎。

○内傷

○調理脾胃 傷食 痞塊 積聚 蠱脹

調理脾胃濕與熱也 脾性濕主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太濕則氣滯太乾則血燥濕熱調停則能食能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善食而瘦由是脾胃不和交相爲病胃變爲寒脾變爲熱大槩以脉浮緩而遅或帶緊爲寒濕脉浮緩而實或細而數爲燥熱又肥人多濕瘦人多熱更参以飲食厚薄可也

且按心口疼不疼 勞傷手按心口不痛食傷手按心口刺痛

食傷初寒久則熱勞倦初熱久寒生 勞倦傷初起熱中宜甘温補中久變寒中宜辛熱温中飲食傷初起寒濕宜辛燥消導久爲濕熱宜辛甘苦寒潤之

熱病（胃）多火痰 眩暈吐 足痿或大便閉

濕病腫脹瀉難停消補清熱與燥濕 勞傷元氣不足宜補益食傷邪氣有餘宜消導勞役飲食俱傷補益消導兼行其中或兼清熱或兼燥濕痰○補劑補中益氣湯主之消導停食枳梗二陳湯加山査麥芽枳朮丸停飲胃苓湯加半夏化痰丸○清熱小調中湯橘皮竹茹湯凝神散三黃

枳朮丸、保和丸○燥濕二陳湯、六君子湯、理中湯、生胃丹、平胃蒼朮膏

乗勝虛實脉堪憑

脾胃爲五臟主風寒暑濕燥一一氣偏勝亦能損傷假如脉弦風邪所勝胃風湯、黄芪建中湯、三白湯脉洪熱邪所乗瀉黄散清胃散調胃承氣湯脉濇燥邪所乗八珍湯錢氏白朮散脉沉細寒邪所乗益黄散人參養胃湯丸附子理中湯丸補真丸脉緩濡無力或時隱伏正氣虛而損也四君子湯參苓白朮散脉緩太過濕邪自甚也平胃散

○氣 氣滯 氣刺痛

諸氣皆因火作孽

七氣喜怒憂思悲恐驚又曰九氣者挾外感寒熱而言也人身陰陽正氣呼吸升降流行榮衛生養臟腑惟七情火炎傷肺閉塞清道以致上焦不納中焦不運下焦不滲氣濁火盛薰蒸津液成痰痰鬱成積初起宜四七湯七氣湯辛温消散稍久宜二陳湯加芩連山梔或當歸龍薈丸木香檳榔丸辛凉以折之最忌辛香助火耗氣之劑雖木香亦好上升必佐以知母黄栢丹溪云上升之氣自肝而出中挾相火其熱爲甚

自覺其冷非眞冷也

閒傷生冷與寒熱

挾傷飲食生冷嘔逆積痛者治中湯加木香或蟠葱散丁香脾積丸或七情後過飽太實痛者煮黃丸因七情過饑胃脘痛者四君子湯加木香○挾寒則腠理密而氣斂於中五積散入裏四逆湯挾風入分心氣飲挾風寒犯臟羌活附子湯挾寒濕五苓散五苓能升降諸氣通利三焦非特分利而已凡此熱劑明知口饞冷物身受寒氣而後敢用亦變法也高陽生專謂冷生氣者泥矣○挾暑熱則腠理開而汗泄於外黃連香茹散加葛根或清暑益氣湯加木香

喜楽恐懼驚嚇勞動散眞元

喜動心氣散不斂過則徙忘歸脾湯恐傷腎精怯不升過則下焦脹滿下和散補中益氣湯驚傷膽神亂不定過則怔忡失志妙香散十味溫膽湯此三者皆令眞元耗散多見不足之症又勞則喘息汗出亦令氣散尤宜補益

怒惱憂愁悲哀思慮逸靜滯結

怒傷肝氣上逆過則嘔吐枳梗二陳湯緋珠正氣天香湯熱者柴陳湯憂傷肺其氣聚過則喘促蘇子降氣湯分氣紫蘇飲噎膈者宜用五膈寬中散悲傷心胞及肺系

其氣急過則為狂者枳殼煮散升陽順氣湯思傷脾其氣結過則痞滿退熱清氣湯溫膽湯木香化滯湯木香枳朮丸此四者皆令邪氣鬱結多見有餘之症又覺則氣滯亦令氣結輕者行動即愈重者橘皮一物湯

結為積聚散虛中

氣結為五積六聚癥瘕疝氣大實痛等疾暫用鹽煎散阿魏撞氣丸木香分氣丸大黃備急丸◎氣散則中虛倦怠無力短氣不足以息宜調中益氣湯人參養榮湯自汗喘急者養正丹俗云氣無補法不思氣虛不運邪着為病不補氣何由行且如喘嗽氣鳴以枳梗姜橘蘇桂調其氣以星半細辛豁其痰而終不下降者氣之所藏無以收也必佐以補骨脂補腎則氣始歸元經曰結者行之散者益之是也

走注眩暈吞酸噎

素無積者濁氣入榮衛則攻刺肩背四肢有積者濁氣滯胸腹腸胃脇肋着於一處則眩暈嘔吐吞酸噎膈痞痺泄瀉心腹絞痛流氣飲子主之或木香勻氣散槌姜飲古萸連丸槌萸丸清膈蒼莎丸選用

胸痞痺臚

二便難

胸膈痞塞枳梗湯胸痺氣塞枳橘湯浮臚木香流氣飲大便難三和散四磨湯秘傳降氣湯燥者麻

子仁丸熟者小承氣湯如壯盛人氣閉胸滿百藥不效者五番蓮翹湯小便閉者五苓散

蒸血兼痰宜審別

血凝則氣亦滯四物湯加香附側柏葉挾瘀血加桃仁紅花或復元通氣散○痰壅則氣逆順氣導痰湯蘇子降氣湯甚者稀涎散微微吐之

治分痰積少與多降火清心尤妙訣

不問內傷外感久皆鬱熱滯為痰積況七情之火無日不起五味之偏無日不積此丹溪河澗力主為火也雖然七情總發於一心七氣總隸於一氣氣陽也動則為火故以降火化痰消積分治量其所稟厚薄而加減之大概氣虛四君子湯氣實古烏附湯為主火多合黃連解毒湯加知母枳殼痰多合二陳湯積多合平胃散痛加玄胡索青皮莪朮寒加官桂吳萸便閉加木香檳榔男子血虛及婦人胎産氣疾合四物湯

○血

吐血　嘔血　衄血　咳唾咯

溺血　便血　腸風臟毒

諸血先須分各經逆則上行順下行

血乃水穀之精變成生化於脾主息於心

藏於肝布於肺施於腎脉絡臟腑耳目手足資為運用然陰道易虧一有感傷調理失宜以致陽盛陰虚錯經妄行火載則上升挾濕則下行是以上溢清道從鼻而出為衂留滯濁道從胃脘而出為咳唾滲入腸間從下部而出為血瘀結於腸胃則成積而為血瘕分經言之嘔吐胃也咳唾衂肺也痰帶血脾也咯血系腎也溺血小腸膀胱也下血大腸也牙宣胃或腎虚炎也又血從汗孔出者謂之肌衂從口出者謂之舌衂心與肝也從委中穴出者謂之膕血腎與膀胱也大槩逆行難治順行易治

外症有潮夜反重無潮者輕有潮者重潮盛脉大者死然痰血亦能作潮日輕夜重者血為陰也如九竅出血身熱不臥者即死

量人虛實氣須清血隨氣行氣行則行氣止則止氣溫則滑氣寒則凝故凉血必先清氣知血出某經即用某經清氣之藥氣凉則血自歸隊若有痰血凝滯又當先去瘀而後調氣則其血立止或元氣本虛又因生冷勞役損胃失血者却宜溫補斂而降之切忌清凉反致停瘀胃膈不散量之

外感積痰宜凉血散劑外感四氣邪炎之劑傳經絡誤汗

誤下以致邪逼經血妄行風症色青多鼻衄者金沸草散去麻黄加桔梗枇杷葉桑白皮或參蘇飲加黄芩○寒症色黯鼻衄點點滴者九味羌活湯麻黄升麻湯○暑熱逼血色紅甚則黒者茅花煎湯調五苓散暑毒攻心嘔血者枇杷葉散去丁香加黄連○濕症色赤烟塵多下血者胃風湯當歸和血散○時毒身熱吐膿者陽毒升麻湯○積熱因飲酒炙煿蓄熱二十焦者黄連解毒湯黄連枳殻二味湯龍腦雞蘇丸四生丸大金花丸槐角丸○瘀血因打撲損傷瘀蓄胃膈者犀角地黄湯桃仁承氣湯

内傷 滋陰温補火自平

内傷七情暴喜動心不能主血暴怒傷肝不能藏血積憂傷肺過思傷脾失志傷腎皆能動血治宜開痰行氣二陳湯加酒紅花升麻扁身黄蓮益者加參朮及附子一片熱者加山梔牡丹皮茜草生地木香氣急者加瓜蔞仁桔梗苦心無汗者茯苓補心湯有汗者歸脾湯素鬱者清肝解鬱湯氣壅者蘇子降氣湯怒失血後被七情四物湯加木香檳榔陰虚者去木檳加玄參黄栢枳殻○内傷飲食生冷滞胃清道氣濁血亂者理中湯加乾葛川芎治衄能分陰陽定血脉冷暈悶者加桂附

傷酒吐血者四君子湯加乾葛川芎山梔○内傷勞役氣衰火盛者单人參湯或四君子湯加蒲黄人乳藕節傷力吐血者猪肝蘸白芨末食或花蘂石散内傷氣散汗出汚衣甚如涴染者黄芪建中湯妙香散或男胎髮燒灰食之胭血十全大補湯○内傷思慮色慾血衰火燥者滋陰降火湯加味逍遥散節齋四物湯腎氣丸

呼嗟男女血為疾

人知百病生於氣而不知血為百病之胎也凡寒熱踡攣痺痛癮疹搔痒好忘好狂驚惕迷悶瘡瘍疼痛癃閉遺溺等症及婦人經閉崩中帶下皆血病也通用四物湯凉血心加黄連小腸山梔仁木通脾加梔芩大腸實芩肝加條芩膽加黄連腎膀胱加黄栢脾加生地胃加大黄三焦地骨皮心胞絡牡丹皮肯氣心與胞絡加麥門冬肺加枳殼肝加青皮柴胡脾加白芍胃加石羔乾葛大腸三焦加連翹小腸赤茯苓膀胱滑石琥珀瘀血加紅花桃仁韭汁童便以行之血來暴者加薄荷玄参以散之血不止者加蒲黄京墨茅根久不止者加升麻引血歸經血止後加炒黒乾姜引血還元血虚加龜板血燥加人乳

保全脾胃可長生

血病毎以胃藥

救助胃氣一復其血自止他如嘔吐後發熱及傷寒汗下後發熱但用調和胃氣自然熱退可見脾胃能統氣血

○痰　喘　膈噎　哮　嘈雜　惡心　關格　嘔吐　痓癇　飽逆　顛狂

驚悸怔忡健忘　咽喉

痰分新久内外邪　痰乃津血所成隨氣升降氣血調和則流行不聚内外感傷則壅逆爲患新而輕者形色青白稀薄氣味亦淡久而重者黄濁稠粘凝結咯之難出漸成惡味酸辣腥臊鹹苦但痰症初起頭痛發熱類外感表症久則潮咳夜重類内傷陰火又痰飲流注肢節疼痛類風症但痰症胷滿食減肌色如故脉滑不匀不定爲異耳

遊溢諸經主病賅　人知氣血爲病而不知痰病尤多生於脾多四肢倦怠或腹痛腫脹泄瀉名曰濕痰若挾食積瘀血遂成窠囊痞塊又名食痰留於胃脘多嘔吐吞酸嘈雜上衝頭面烘熱名曰火痰若因飲酒乾嘔噯臂脇痛又名酒痰升於肺多毛焦面白如枯骨咽乾口燥咳嗽喘促名曰燥痰久爲老痰鬱痰

又七情痰滯咽膈多胷脇痞滿名曰氣痰迷於心多怔忡
顛狂夢寐奇怪名曰熱痰動於肝多眩暈頭風眼目瞤動
昏澁耳輪搔痒脇肋脹痛左癱右瘓麻木蹺跛奇症名曰
風痰聚於腎多足膝酸軟腰背強痛肢節冷痺骨痛名曰
寒痰又名虛痰流注渾身習習如虫行或身中結核不紅不腫
腫或頸項結核似癧非癧或走馬喉痺或胷腹間如有二
氣交紐噎塞煩悶或背中常有一點如冰冷痛或心下水
冷時痛或四肢腫硬似痛非痛或骨節刺痛無常處或吐
冷涎綠水黑汁或大小便膿或關格不通以至癆瘵荏苒
婦人經閉小兒驚搐皆須先去其痰然後調理他如閃家
胷骨撲傷刺痛不已散血之劑罔効續以自己
小便飲之須臾吐痰其痛立止百藥兼痰如此

風青寒黑濕色白

風痰外感賊邪或脅枯木動或内風鬱熱色青而
光風虛二生飲古龍虎丹風熱小省風湯搜風化
痰丸兩神丹竹瀝膏 ○ 寒痰因形寒飲冷色深青黑如灰
善嚏或喘輕者五積散重者温中化痰丸古
半夏丸 ○ 濕痰或外感濕滯或停飲不散色白喘急者千
緡湯心痛者單半夏丸或神术丸濕熱色黄者中和丸青

膈蒼莎丸在裏者青礞石丸

熱黄甚則帶紅些　熱痰因厚味積熱或外感誤溫所致色黄甚則帶血或紫清氣化痰丸煎服大金花丸滾痰丸

火鬱稠粘氣如絮　火痰因飲食衣褥過厚火蒸津液成痰稠濁二陳湯加芩連山梔或抑上丸潤下丸○鬱痰即火痰鬱於心肺之久者凝滞胷膈稠粘難咯忌南星半夏燥藥宜開鬱降火清金潤肺緩以治之節齋化痰丸謝傳清金丸貝母丸霞天膏○氣痰七情鬱成咯之不出嚥之不下形如破絮或如梅核四七湯久者換蘇子加黄芩山梔海石三仙丸千金指迷丸

食痞酒臂脇痛加　食痰因飲食不化結成痞塊橘半枳朮丸痰壅喘急者瓜蔞實丸山查麥芽煎湯下脾虛者黄白丸傷冷心下堅大如杯者名氣分枳朮丸料煎服痰癖硬如杯時有水聲者神保丸○酒痰小調中湯香附瓜蔞青黛丸

痰飲有五因只一汗吐下溫用莫差　痰伏胞絡自肺竅嗽出涎伏脾元自口角流出飲生胃腑從食脘吐出五飲六症留飲伏飲合爲一此皆因飲水及茶酒停蓄不散再加外邪生冷七情

相搏成痰即酒痰久而濕勝者與傷寒水症大同脉多弦滑或伏眼下皮如灰黑○痰飲水停腸胃腹響轆々有聲令人暴肥暴瘦懸飲水流在脇咳唾則痛懸癖思水溢飲水流四肢身體重痛支飲水停膈上飽逆倚息短氣留飲水停心下背冷如手掌大或短氣而渴四肢歷節疼痛脇痛引缺盆咳嗽轉甚伏飲水停膈滿嘔吐喘咳發熱惡寒腰背痛淚出或身瞤惕仲景治諸飲在皮裏膜外表分者大小青龍湯汗之在胸膈者瓜蔕散吐之在四肢經絡脇肋者五苓散分利之在腸胃裏分者十棗湯下之此皆治標之覇道也從輕汗以参蘇飲吐以二陳湯加防風桔梗探之分利五苓散下以開結枳朮丸中間以小半夏湯古葶棗散枳朮丸温中化痰丸清氣化痰丸半夏温肺湯隨虚實加減不必太泥

常法順氣與分導

古法順氣爲先分導次之然氣升屬火因氣動者曰痰氣順氣導痰湯因火動者曰痰火清熱導痰湯因濕動者曰濕痰導痰湯主之通用二陳湯能使大便潤而小便長充爲分導要藥風加南星皂角白附子竹瀝寒倍半夏加姜附姜汁火加石膏青黛濕加蒼朮白朮燥加瓜蔞杏

作老痰加海石芒硝瓜蔞食積加山查神麯麥芽停水加檳榔痰在脇下加白芥子以行之痰在四肢加竹瀝痰在經絡用此探吐痰在皮裏膜外加白芥子竹瀝姜汁氣實用荊瀝

墜下溫中潤肺家

痰原於腎動於脾客於肺水升火降脾胃調和痰從何生○陽虛腎寒不能收攝邪水冷痰溢上或昏暈夜喘上氣者八味丸三味安腎丸黑錫丹以鎮墜之如痰壅發厥者蘇子降氣湯三生飲古硫汞丹○脾虛不能運化者宜補中燥濕六君子湯加竹瀝姜汁勞役傷脾失升降者補中益氣湯加半夏竹瀝姜汁○氣血虧乏痰客中焦閉塞清道者仍宜溫中燥脾二陳湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯○陰虛腎火炎上肺燥者二陳湯合四物湯去川芎半夏加貝母麥門冬瓜蔞仁桔梗潤而降之或腎氣丸三一腎氣丸語云痰無補法且老痰凝滯膠固非暫用溫藥引導必有拒格之患風寒痰氣內鬱不可用溫散亦何以開結滯此皆難拘於無補也凡痰喘聲高脉散汗出如油身冷者死

○鬱

鬱與氣類參看寒鬱如心脾腹痛火鬱如脇痛跌撲癰疽瘡癧縲鬱如腰脚筋痛分見各類

六鬱仍分痰火積鬱者病結不散也六鬱氣血痰食濕熱然氣鬱則生濕濕鬱則成熱熱鬱則成痰痰鬱則血不行血鬱則食不消而成癥痞六者皆相因爲病以致當升不升當降不降當變化不得變化故法以順氣爲先降火化痰消積分多少治與諸氣大同凡病當先尋六鬱與痰火有則急治於此無則依雜症治**久則升散三焦通**鬱本病久不解因服藥雜亂而成又有鬱久而生病者俱宜升提如鬱在中焦以蒼朮川芎開提其氣以升之如食在氣上提其氣則食亦自消痰鬱火邪在下二使下利者二陳湯加升麻柴胡小芎防風以升發之熱鬱升陽散火湯火鬱火鬱湯主之當看發在何經加各經火藥又五鬱治法見第七卷**氣痰滿胷血能食**丹溪治病氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯時以六鬱湯料參之此雜病治法總要也

氣鬱胷滿脇痛脉沈濇加木香檳榔烏藥蒼朮小芎倍香附砂仁痰鬱胷滿動則喘急起臥怠惰寸脉沈滑加南星香附瓜蔞仁海石血鬱四肢無力能食小便淋大便紅脉沈芤濇加桃仁韭汁牡丹皮**食脹濕痛**熱

目蒙二陳湯爲主食鬱噯酸惡食黄疸鼓脹痞塊氣口緊
盛加山査神麯麥芽傷冷食胃脘痛加草豆蔻乾姜縮
鬱遇身關節走痛首如物蒙足重亦然渇陰寒便發脉沉
濡加白术倍蒼术熱鬱目蒙口乾舌燥小便淋濁脉沉數
加黄連倍山梔連翹六鬱不言風寒若風寒鬱則爲熱
故也但諸鬱挾風加防風苦参挾寒加呉茱香附紫蘇脘

營愚者眠食廢先順後逆雖不中邪病從内生令人飲食無味神倦肌瘦名曰脱營内服交感丹外
用香鹽散臨臥擦牙有鬱結在脾半年不食或午後發熱
酉戌時退或煩悶作渇加嘔或困臥如癡向裏坐亦喜向
暗處婦人經水極少男子小便點滴皆憂思氣結治宜温
膽湯或二陳湯加参术紅花痰火甚者以痰藥吐之下之
後用越鞠丸調理

有志養陰神自充平人上納下化水穀滋沛身中陰氣自生如失名利之士
有志悵圖過於勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘
不通而胃熱熏胷中則内熱宜養陰降火三白湯加陳
皮蒼术川芎山梔香附枳殻甘草煎熟入姜汁少許熱服之
以散其鬱加當歸黄柏沙参或玄参以養其陰痰加貝母

夏加麥門冬冬加補骨脂蓋當歸隨參耆補血白芍隨二朮
除鬱因食冷物鬱遏陽氣於脾土中多因血虛而得之故
用炒黑山梔解五臟結益少陰血
若不早治復恣酒色癆瘵之由也

○積熱

積熱三焦實虛口乾煩渴大便窒

實熱因日服金石炙煿夜臥熱炕或火爍衣被久則蘊積熱毒在上焦則咽乾口燥而鼻舌糜唇瘡在中焦則胸膈滿乾嘔作渴在臟腑則大小便閉法當清心解毒上熱涼膈散中熱調胃承氣湯下熱八正散三焦俱熱三黃湯大金花丸○虛熱因消爍腎水相火炎上口燥煩渴精神短少心悸自汗懶於動作夜臥驚語法當降火滋水三補丸主之或只清之潤之而已

實分氣血清各經

氣分實熱白虎湯或敗毒散加荊芥青皮白朮血分實熱四順清涼飲氣血俱實熱洗心散芍藥飲澤瀉湯○心熱單瀉心湯肝熱瀉青丸脾熱瀉黃散肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱導赤散胃熱瀉胃湯大

炕

腸熱瀉白湯膀胱熱加味五苓湯然諸熱皆屬於心熱甚則能傷陰宜硃砂安神丸以清鎮之

虛炎升降與滋益

氣分虛熱淸心蓮子飲甚者龍腦雞蘇丸久者宜升陽以散之小柴胡湯合四君子湯升陽益胃湯補中益氣湯或問補中益氣何以治熱孰不知熱因熱用溫能除熱之理蓋大熱在上大寒必伏於內溫能退寒以助地氣地氣者在人乃胃之生氣使眞氣旺而邪熱自退○血分虛熱四物湯加芩連山梔或爲丸服久則滋陰以降之秦艽扶羸湯或古歸芪湯滋陰降火湯蒸熱者加味逍遙散坎離丸○氣血俱虛熱升陽滋陰兼用十全大補湯人參養榮湯俱加知母黃柏然虛熱久必脾胃不和二白湯參苓白朮散調之

風痰濕熱常相兼變症多端難執一

風熱風甚生熱者兼治風熱或熱甚生風者治其熱而風自消凡頭目腫痛眩暈眼昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙腫班疹之類皆風熱炎上之所爲也初起上攻者川芎茶調散至寶丹四神丹上清丸久而下法血虛者腎氣丸加知母黃柏或當歸龍薈丸四生散○痰熱者因痰生熱或因熱生痰

凡咽痛喉閉膈噎胷痞顛狂驚悸怔忡健忘之類皆痰火滞中之所為也小調中湯大調中湯 ○湿熱者因湿生熱或因熱生湿凡泄瀉下痢水腫鼓脹黄疸遺精白濁疝痛腰痛脚氣之類皆湿熱下流之所為也治見各條丹溪治湿熱上焦黄芩虚者天麥門冬代之中焦黄連虚者白朮茯苓葛根代之下焦草龍膽防已黄柏虚者肥人蒼朮南星滑石瘦人牛膝檳榔桃仁紅花經曰治病必求其本此風熱痰熱濕熱乃百病之根本也

○諸虚

發熱 悪寒 自汗 盗汗
厥 癆瘵 求嗣 養老
痿

諸虚專要辨陰陽血陰而氣陽也有暴虚而無傷損者易復有虚而羸損者亦可補益惟久虚而傷壞者必保養俻可半愈大槩虚脉多弦弦濡大而無力者為氣虚脉沉微無力為氣虚甚脉弦而微為血虚脉濇而微為血虚甚或寸微尺大而緊者血虚有火多汗食少又形肥而面浮白者陽虚形瘦而面蒼黒者陰虚此虚証神昏精不藏腰背胷脇筋骨痛潮汗痰嗽是其常也但見

一二便是外因新損容易復

外因感寒久則損陽自上而下一損於肺則皮聚毛落二損於心則血脈虛少不榮臟腑婦人月水不通三損於胃則飲食不為肌膚治宜辛甘苦淡過於胃則不可治矣感熱久則損陰自下而上一損於腎則骨痿不能起於床者死二損於肝則筋緩不能自收持三損於脾則飲食不能消尅治宜酸苦甘鹹過於脾則不可治矣又不內外因驚而奪精汗出於心則損脈疾走恐懼汗出於肝則損筋搖體勞苦汗出於脾則損肉飲食飽甚汗出於胃則損陽持重遠行汗出於腎則損骨治宜酸苦甘辛散於心則不可治矣抑論心肺損而色憊汗多者為陽虛肝腎損而形痿汗多者為陰虛經云損其肺者益其氣損其心者補其榮血損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精是以古方肺損症見四君子湯心損症見四物湯心肺俱損者八物湯心肺及脾胃俱損者十全大補湯肝腎俱損者牛膝丸雜症兼虛夢遺者桂枝湯加龍骨牡蠣四肢煩熱酸疼心悸腰痛者小建中湯汗多力少筋骨拘急者黃芪建中湯汗多脈結者炙甘草湯暴損氣虛有汗潮

熱者補中益氣湯氣虛無汗潮熱者人參清肌散暴損血虛有汗潮熱者人參養榮湯血虛無汗潮熱者茯苓補心湯暴脫血者益胃升陽湯潮汗痰嗽者黃芪益損湯加半夏大病後食減盜汗者參苓白朮散加黃芪當歸

勞慾久虛成內傷

經年不愈者謂之久虛五勞應五臟六極即六慾應六腑蓋心勞曲運神機則血脉虛而面無色驚悸夢遺盜汗極則心痛咽腫肝勞盡力謀慮則筋骨拘攣極則頭目昏眩脾勞意外過思則脹滿少食極則吐瀉肉削四肢倦怠關節肩背強痛肺勞預事而憂則氣乏心腹冷胸背痛極則毛焦津枯咳嗽閧熱腎勞矜持志節則腰骨痛遺精白濁極則面垢脊痛此五勞應乎五極者也甚原因腑虛以致臟虛臟腑俱虛視聽已衰行步不正名曰精極令人精濁莖弱核小故又曰六極極即傷也七傷者推原勞極之由久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋房勞思慮傷心腎則陰血虛勞役饑飽傷胃脾則陽氣虛此傷症之至要也○陰虛四物湯二宜丸腎氣丸火動外潮者四物湯加知母黃柏或滋陰降火湯丸加

皆

味逍遥散補陰丸火燥甚若大補陰丸単天門冬膏○陽虚四君子湯保元湯火衰中寒身冷者鹿茸大補湯蓯蓉散加减内固丸三仙丹温腎丸臚納補天丸斑龍丸○陰陽倶虚八物湯固真飲子或八九人参養栄湯或十全大補湯加蓯蓉附子半夏麦門冬或八味丸有火者二至丸異類有情丸○心虚人参固本丸奏授天王補心丹朱子讀書丸肝虚天麻丸鹿茸四斤丸脾虚参苓白朮散橘皮煎丸蒼朮膏白朮膏参苓造化糕太和羹肺虚単人参膏単五味子膏腎虚小兎絲子丸玄兎固本丸三味安腎丸太極丸

調和心腎養脾胃

不論陰陽損傷皆因水火不濟火降則血脉和暢水升則精神充満或心腎倶虚或心脾倶虚或心肝倶虚或肺腎倶虚或五臓倶虚但以調和心腎為主兼補脾胃則飲食進而精神氣血自生○調和心腎虚中有熱者古庵心腎丸虚中有寒者究源心腎丸不受峻補者帰茸丸瑞蓮丸滋補丸兼補脾胃二神交済丹還少丹天真丸巡本丸

挾熱與氣細酌量

虚者下虚也熱者上熱也又言虚實者正氣虚邪氣實也心労邪熱則口舌生瘡語濇肌痩肝

勞邪熱則腸滑關格不通脾勞邪熱則氣急肌痺多汗肺
勞邪熱則氣喘面腫口燥咽乾腎勞邪熱則尿赤陰瘡耳
鳴瀉閉三白湯主之心熱加黄連木通麥門冬生地肝熱
加黄芩防風當歸龍膽草赤芍脾熱加山梔石斛升麻肺
熱加知母桑白皮秦艽葶藶腎熱加玄参赤茯車前子生
地更参積熱門虛炎治法○按氣者交感丹古庵云心腎
主血心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉
肺脾也肺脾主氣肺惡寒而脾惡湿則温寒燥湿之藥是
補肺脾而瀉心腎也爲方者用辛香燥剤以能健脾進食
然陰血消而心腎損以致虚極火炎面紅發喘痰多身熱
妙次跌腫溏泄脉緊不食者死意凡虛
皆陰血陰氣虛也若真陽虛亦不可治　從來養性延年藥
只是中和効更長　經云形不足者温之以氣温存以養使
氣自充非温藥峻補之謂也精不足者
補之以味乃天地自然之味非膏粱之謂也今人無病貪
補而致病者有之有病貪補而不依症用藥反增病次者
有之非惟不足欲疾延年亦非養心養性之道且少年慾
火正熾尤宜戒補中年以後必資藥餌扶持者亦須量體

宜從緩治不可責效目前反致奇疾大臟腑虛者瓊玉膏還元秋石丸延年益壽不老丹耳目衰者還元丹四聖不老丹松栢實丸腎虛無火者何首烏丸卻老烏鬚健陽丹腎虛有火者八仙添壽丹羸瘦者大造丸紫河車丹血疾者女貞丹栢葉煎栢脂丸秤金丹風疾胃火者松脂丸松梅丸風疾無火者仙人飯痰火彌滿者茯苓煎氣弱者單人參膏血燥者單天門冬膏地黃膏脾虛者白朮膏脾胃俱虛者加味蒼朮膏此皆養性延年之藥亦必因病選用

○沉寒痼冷

沉痼大補氣血煖胃脾　人身真陽耗散脾胃虛弱加以飲食生冷嗜慾過度以致臟腑停寒不散謂之沉寒積冷不罷謂之痼冷宜十全大補湯鹿茸大補湯加姜桂雄附以滋氣血補煖下元若原只因生冷傷脾者四柱散附子理中湯補真丸專補脾胃可也又有陰虛內熱因傷冷藥及將息失宜鬱久成寒中全以養脾為主只宜理中丸二神交濟丹去芎芍或四物湯去芍藥合理中湯

男精女帶吐瀉奇　或暴下或久瀉

則

或吐瀉俱發宜古半附湯附子理中湯沉香華澄茄丸
遺精金鎖正元丹究源心腎丸硫苓丸崩帶見婦人門**脳
寒股冷心腹痛**腦髓寒者三五七散四肢冷者古姜附湯
古桂附湯氣虛冷汗出者古參附湯古芪
附湯血虛冷者古茸附湯遍身冷昏暈者三建湯順元散
心腹絞痛甚者椒附丸復陽丹挾外感者正氣補虛湯
剛劑慢投恐腎衰金液丹黒錫丹養氣丹返陰丹盡皆金
石悍劑陰臟性緩漸服回陽即止猛進
常服恐水枯火躁元陽
脱矣陽臟性急者禁服**取陰取陽無過治王氷此語亦吾
師**古以三建湯治心經之元陽虛者責其無火也大補陰
丸治腎經之真陰虛者責其無水也蓋人之所藉以生
者陰陽之氣耳不善調攝偏熱偏寒病未至甚治之不難
若夫積熱始而凉和次而寒取寒取不愈則因熱而從之
從之不愈則技窮矣由是苦寒頻歲而弗停沉寒始而温
和次而熱取熱取不愈則因寒而從之從之不愈則技窮
矣由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不衰者
由於眞水之不足也以熱治寒而寒不衰者由於真火之

不足也不知水火不足泛以寒熱藥治非惟臟腑習熟藥反見化於其病而有者弗去無者復至矣故取之陰所以益腎水之不足而制心火之有餘也取之陽所以益心火之不足以勝腎水之有餘也火之原者陽氣之根水之主者陰氣之根非謂火爲心而原爲肝水爲腎而主爲肺也此太僕達至理之妙也又積熱用苦寒藥必以姜汁酒製沈寒用熱藥如附子必用童便蜜製蓋寒因熱用熱因寒用恐相激逆故也

右雜病提綱　雜病者或兼外感風寒暑濕燥火之氣或挾內傷宿食氣血痰鬱虛實之情外感驟則爲四中內傷久則爲沈痼所以提之於前以見其爲百病大綱其餘症皆由此變出醫能知此門戶又能知從頭至足

問症之法第一　辨其爲內傷耶爲外感耶外感手背熱

而口能知味内傷手心熱而口不知味外感傷風惡風
而光有汗傷寒惡寒面慘無汗傷暑惡熱煩渇面垢傷
濕惡濕重着面黄内傷勞役傷氣則惡勞而心口不痛
飲食傷脾則惡食而心胃刺痛若夫色慾傷腎則愈好
色而骨蒸口多嗜味陰虚火動故也七情思慮傷心與
脾則益善思而恍惚不寐憂愁傷肺與肝則愈動氣而
痞滿脇嘔口仍失味諸氣怫鬱故也一切血症日輕夜
重一切痰症食少肌色如故一切火症性急潮盛一切
水症脇硬心下怔忡至於辨症虚實倶以似傷寒陽症

者爲熱且積也似傷寒陰症者爲虛且寒也又辨其内外有無相兼多寡或不内不外而爲本經自病男子必審房勞女人先問經孕與所處順逆及曾服其藥然後證之以脉萬無一失噫機括熟而門類顯者惟不脉而藥可以廣及然亦難乎其人之妙悟也病家一時緊急尋醫辨症且將此提綱理會亦不致差門戶以後分類有言外因風寒暑濕内因七情瘀血痰火食積而不詳言其症者正以括之於此也以意會之醫門斯可入矣

雜病分類

△風類

○頭眩

頭眩欲倒辨瘦肥 或云眩暈或云眩冒眩言其黒運言其轉冒言其昏一也虚者内外之邪乗虚入表而上攻實者内外之邪鬱痰上結而下虚大築肥白人多濕痰滯於上火起於下痰因火而上衝所謂無痰不作眩者是也治宜以痰爲主兼補氣降火瘦人多腎水虧少相火上炎而眩暈所謂風勝則地動火得風則焔旋是也治宜滋陰降火化痰抑肝此以肥瘦爲主亦用藥常法也後倣此

眼花昏暗屋旋飛 經曰徇蒙招尤徇蒙者如以物蒙其首招尤者招搖不定也如立舟車之上是則欲倒眼昏耳聾屋亦旋轉甚則卒倒不省人事乃肝所主也又曰諸脈皆系於目藏腑筋骨氣之精而與脈并爲系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虚其入深則隨眼系入於腦則腦轉腦轉則引目系急而眩矣

虚弱老年陽陷越 内傷勞役

氣虛不能上升或汗多亡陽宜補中益氣湯治色慾傷腎氣逆不能歸元四君子湯加天麻防風或十全大補湯腎氣丸加鹿茸○血虛因產後金瘡及吐衄亡血孤陽浮越古芎歸湯加炒乾姜瘀血滯胸加童便○老年每早起眩暈須臾自定有風痰虛火者果係陽虛頭元散黑錫丹以鎮墜之平昔謂丹藥金石助火香竄散氣多致飛越之丸豈能鎮其不歸之氣耶

火痰暈甚氣痛眉

火動其痰眩甚者二陳湯加芩連蒼朮羌活次盛卅實屬陽明者單大黃酒炒爲末茶清下或古荊黃湯加防風等分屬太陽少陽者酒芩白芷等分爲末茶清下虛火半夏白朮天麻湯○七情臟氣不平涎迷心竅眩暈眉棱骨痛眼不可開者七氣湯玉液湯補腎飲

風則項強寒拘痛

外因風脈浮有汗頭強熱者川芎茶調散或參蘇飲加南星黃芩熱甚者川芎石羔散虛者肉茱萸散或四物湯加秦艽羌活通用單白芷丸又大風頭眩手足麻痺胃脘發痛乃風寒濕三痺合至必有痰飲在上宜量吐之○寒脈緊無汗四肢拘急筋攣頭掣痛五積散熨熱手按者附子理中湯三五七散

暑煩渴

芎濕重痛 暑着脉虚煩渴十味香茹散或二陳湯加黄連山梔川芎○濕脉細頭重吐逆芎术湯芎术除濕湯或腎着湯加川芎風濕玉壺丸

外邪和解清痰火内虚本固標自移

肝脉溢大必眩宜預防之外感解肌化痰不可妄施汗下内因暈施補益昔丹溪治婦人帶下頭眩專治帶而眩自安蓋頭眩頭痛咳嗽病之標也經曰治病必求其本○通用二陳湯七情加丁香砂仁白术風痰加天麻白附子荊芥防風寒痰加乾姜良姜熱痰合解毒湯濕痰合芎辛湯停水心悸合五苓散酒食傷加藿香生姜胸中宿痰眼溢手麻痺嬰脱健忘者用本方探吐吐後宜服清上辛凉之藥調之氣虚倍參芪血虚倍芎歸痰盛加竹瀝姜汁火盛加童便姙娠眩暈氣上衝胸戰搖者只宜茯苓桂术甘草湯加減○凡眩暈言亂汗多下利時時自冒者虚極不治

○頭痛

厥頭痛將内外分 又眞頭痛引腦巓泥丸盡痛手足冷至節者死厥者逆也邪氣逆上陽經而作痛

甚則發厥須分内外二因治之

外感寒熱表裏家論

外感頭痛必有寒熱宜分輕重解表○風症芎芷香蘇散消風散風熱川芎石膏散風寒三五七散風寒入腦連齒痛者芎辛湯或羌活黑附湯去附稍加桂枝腦風項背怯寒腦戶極冷者用麻黃細辛全蝎藿香各五分為末荊芥煎酒或茶下○寒症連鬚葱白湯葛根葱白湯○暑症香薷散加茵陳葱白或大半夏湯姜汁爲丸服○濕症芎朮湯濕熱心煩痛起耳中古防風湯加酒芩蒼朮蒼耳子細辛爲末茶清入姜汁少許調服熱多者酒芩爲末茶清下○通用二陳湯加芎芷爲主太陽惡風寒脉浮緊加羌活麻黃川芎陽明自汗發熱惡寒脉浮緩長加升麻葛根白芷渴者宜合白虎湯加吳茱萸白芷少陽寒熱往來脉弦加柴胡黃芩如三陽留膈宿痰痛久不止令人変明宜合川芎茶調散探吐太陰體重腹痛脉沈必有痰加蒼朮南星少陰寒厥脉沈細加附子細辛厥陰吐涎厥冷脉浮緩加吳茱萸頭頂項背俱痛者宜合羌吳湯肥人加二朮瘦人加酒芩風熱加蔓荊子川芎酒芩苦頭痛加細辛巔頂痛加藁本升麻防風○内虛氣滯太陽

内傷氣虛相火上衝耳鳴九竅不利兩太陽穴痛宜補
中益氣湯倍川芎加知母蔓荊子或四君子湯太病後
及諸虛痛者四
桂散加茶一撮

血虛魚尾上生頭

古芎歸湯或四物湯加
酒芩羌活柴胡蔓荊子
氣血兩虛者調中益氣湯加
川芎細辛挾火者安神湯

腎虛巔痛七情嘔

腎厥下虛
上盛巔頂
痛不可忍脉舉之則弦按之則堅宜玉真丸○七情氣厥
心腹脹滿嘔吐酸水宜古芎烏散葫蘆芭散挾痰如聖餅
子頭與心攪痛
者古藁蒼湯

痰火食積皆同因

痰厥頭旋眼黑言亂一忘
心眼閉股冷宜半夏白
朮天麻湯導痰湯加芎辛三生丸○痰火痛甚如破二陳
湯加芩連或清空膏清上瀉火湯如壯實人只宜酒炒大
黃爲末茶清下○痰飲滯痛者神芎丸有伏痰者瓜蒂散
吐之○積聚痛者太黃備急丸○凡頭痛數日不食百藥
不効者二宜氣丹無熱者黑錫丹常服黑頭散斷根○尋常
頭目不清似痛非痛參蘇飲主之風熱者微清膏芩連煎
湯調下沐浴後九
者鼻白芷丸

○頭風 附眉稜骨痛

頭風項強分偏左 熱有痰者或櫛沐取涼及酔飽仰臥賊風入腦入項入耳入鼻自頭項已上耳目口鼻眉稜之間有一處不若吾體皆其漸也有頭皮浮頑不自覺者有口舌不知味者或耳聾或目痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作眩冒之狀甚則項強硬身體拘急宜川芎茶調散或袪風通氣散主之此正頭風也○偏左痛者多血虛或有火或風熱偏右痛者多氣虛或鬱滯或痰或風濕要知正痛常兼左右病邪凡頭痛久則為風也

兼濕兼熱陰痿定 風濕腫痛連肩背或遇陰雨則甚者羌活勝濕湯○風熱頭痛重大遇熱則發消風散倍荊防熱甚二陳湯加荊防薄荷便閉更加大黃微利之熱微二陳湯加酒芩防風

濕痰痛竅多右邊 濕痰發則痛竅無間二陳湯加南星蒼朮川芎及細辛少許芎芷

血虛晩重為左病 血虛者朝輕夕重古芎歸湯或四物湯加荊防白芷薄荷○若氣虛者朝重晩

痛多屬右邊宜補中益氣湯加芎辛陽虛甚者单白芷丸用參附煎湯下久甚火鬱是重綿頭風發時閉痛必欲緜帛裹包者熱鬱也宜涼血瀉火為主佐以辛温散表從治二陳湯加酒炒黃芩及荊芥薄荷川芎石羔細辛或消風百解散防風通聖散○有三陽熱鬱頭痛不敢見光喜置冰於頂者宜辛涼汗吐下三法並行乃愈又有偏痛年久便燥目赤眩暈者乃肺乘肝氣鬱血壅而然宜大承氣湯下之外用大黃芒硝為末井底泥調塗兩太陽穴上乃愈不妨外感相兼併素患頭風因外感而發者惡寒頭面多汗宜分偏正專治頭風而外感自散如頭風發方愈而後外感自汗者加味烏荊丸因七情發多吐逆寒熱者参蘇飲主之無寒熱者二陳湯加烏藥川芎眉稜眶痛或羞明無非痰與風熱甚風痰眉心上痛者二陳湯吞青州白丸子眉稜骨痛連目不可開晝靜夜劇身重者導痰湯濕痰眉眶骨痛體重者芎辛湯合導痰湯加川烏白朮寒濕芎辛湯加川烏附子姜桂南星○風熱眉稜骨痛甚者古防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或

金櫜丹血虛挾風羞明眉眶痛甚者生熟地黃丸或四物湯加羌防氣虛挾風安神湯○通用謝傳眾服丹搐鼻藥

○面風

面腫虛食熱不食 面腫乃食後胃風所致能食者風虛面麻木牙關急搐升麻胃風湯不食者風熱面唇黑心懸如饑防風通聖散內傷氣促者升麻順氣湯

頰腮同此分虛實 面腫搭頰搭腮仍以能食為風虛不食為風熱搭頰連齒腫出血者胃火也清胃散搭腮因膏粱積熱者升麻黃連連翹牛蒡子白芷等分水煎進耳上加羌活耳下加柴胡內虛食少者補中益氣湯耳後微腫者腎虛也腎氣丸料水煎服詳外科痄腮

陽盛面熱陽衰寒 手足陽明經氣盛則身已前皆熱風熱上衝則面獨熱先以調胃承氣湯加黃連犀角下兩三行次以升麻葛根湯加黃連川芎荊芥薄荷調之如陽明氣不足則身已前皆寒寒濕上蒸則面反不能耐寒先以附子理中湯數服次以升麻葛根湯去芎加參芪附子益智草蔻白芷葱白面浮者補胃湯連

骨痛者乾姜散

生瘡總是胃家疾 凡風客皮膚痰漬臟腑則面野黙黷脾肺風濕搏熱生瘡紅紫或腫者俱宜金沸草散倍黃芩或升麻胃風湯加減○面上細瘡常出黃水或目生瘡用桃花陰乾爲末熟水調服外用杏花煎湯洗之如生五色瘡只用塩湯綿浸搭瘡上日五六易如生粉刺搗兎絲子汁塗之內服樺皮散○面皮裏痛者用何首烏爲末姜汁調敷以帛蓋定灸熱鞋底熨之

○眼

眼病須先分表裏 外因風中腦戶濕漬頭上熱遏冷灌睛中或久處烟火或食後向火或醉後失枕血滯痰壅或冒砂塵或樺刺樸損湯泡火燒皆傷目之標內因五辛炙煿酒麪濕熱痰火房室損精勞役傷氣泣涕刺頭傷血暴喜暴怒暴驚極目遠視夜書細字鏤刻博奕傷神皆傷目之本初起在腑爲表當除風散熱久則入臟爲裏當養血安神然內因初即入裏外因久亦帶表悟之

五輪八廓亦此理 表症多屬三陽

部分裏症多屬三陰部分要知以肝為主表裏虛實不過五行生尅之理八廓不必深泥舊説七十二症今纂註于內更不重複便覽

五輪　白肺　烏珠肝

白屬肺氣之精曰氣輪氣症七情氣滯則血凝紅膜薄如傘紙日久變成白膜者難治○熱症白睛潤濕浮而赤腫筋多重者生紅花翳痛澁有淚年深睛變碧色滿目如凝脂赤路橫直如絲宜四物湯去芎換土當歸加芽草○虛症白睛枯槁氣澁而濁○烏珠屬肝部之精曰風輪風症睛閃兩瞼不歸中如轆轤轉關難治○熱症赤暈浮漿重者烏珠忽然如針刺痛雙目緊急或突出豆許如蟹睛者忌點或生翳似旋螺尖突出或周圍生翳如鋸齒如棗花四五枚相合赤色制痛或生翳四邊皆白中間一點黃必或生翳如玉色浮蒲不痛者忌針割或生青色翳兩眥澁痛或翳如冰色堅實傍觀遍透瞳人○虛症輕者枯黃遶睛重者烏珠上一點圓翳日中見之差小陰處見之差大或一點黑翳如小豆疼痛淚出者忌點又肝虛雀目曉明晚暗乃所稟血虛有次也年深則盲黃風雀目者木受土盛終當變黃脹而死宜平胃散以平土氣四物湯以補肝

虛經年瞳子色如金者不治 ○不治症生翳上橫如劍脊
下面微微甚薄不赤不痛或浮翳如冰光白色環遶瞳人
初生自小眥頭至烏珠上不痛痒無血色相潮或翳如凝
脂邊厚邊薄形如缺月色光無瑕或生翳經年如銀釘釘
入烏珠或因他病生翳 心與小腸內外眥 內眥屬心外眥
初甚微後遍睛俱白 屬小腸血之精
曰血輪熱症輕者赤脉纏眥重者赤脉漸漸侵睛或眥頭
結聚生瘡流出膿汁延水粘睛上下乃風熱留瞼中宜白
薇丸 ○氣症 努肉攀睛或先赤爛多年肝熱所衝或用力
作勞有傷肝氣而成或痛或痒兩眥努出心氣不寧憂思
不已遂乃攀睛或起筋膜宜三黃丸黃芩
防風薄荷等分入蜜煎服或定心丸 上下兩胞胃與脾
肉之精曰肉輪又上胞瞼內銳眥係足太陽走脉 ○風症
輕者胞弦緊急重者上下瞼似硃砂而生瘡久則生翳乃
風熱也或眼皮有如膠凝腫似桃李時出熱淚乃風毒也
宜點花草膏又爛弦風痒甚雙手背揉日久兩瞼赤爛粘
滯經年不安宜三稜針刺目眶外以瀉濕熱內服消風散
桑白皮煎湯調服又倒睫拳毛淚出諂消翳膜漸生不愈

作發經年不安眼皮瞤急如鉤刺痛瞳人不安乃脾受風熱當去內熱退火邪令眼皮緩則毛出翳退外用手法翻皮瞼向外以三稜針橫刺用左手爪迎其針鋒出血再用木鱉子搗爛以絹包成條左患塞右右患塞左鼻中其毛自分先宜瀉肝散後服五退散又上下瞼俱翻出或一下瞼翻出在外乃脾風熱也○熱症輕者瞼紅赤硬睛疼淚出羞明重者兩瞼上下初生如粟漸大如米或赤或白不甚疼痛堅硬乃肝壅瘀血也宜加味荊黃湯又瞼內生如鷄冠蜆肉或青或黑阻得睛痛乃脾風熱也須翻出看之用觀音草每白輕輕微微漸漸揩去毫聳血出用金匙挑洗風毒藥水拔而止之刮後不睇將藥水點入則不復腫

腎水一點黑瞳子

骨之精曰水輪虛症瞳人散大視物不真火盛則瞳人焦黃虛冷則瞳人青綠少勞則痛○熱症瞳人內陷輕者如不患眼人但微有頭旋生花或勞力轉加昏蒙或頭旋相牽瞳人連鼻膈皆痛時起紅白或黑花吐逆肝熱則先左肺熱則先右肝肺熱則左右齊發重則生翳瞳人上如凝脂色溢痛無淚成滑翳如水銀珠子微含黄色遮瞳人或散翳形如魚鱗點或瞼

下起粟子而爛瞳人痛甚又白翳旋遶瞳人點點如白花鱗砌皆肝肺相傳風熱也又黑水上横深瘢盤青色洗洗深入痛甚乃五臟風熱也或血灌瞳人無翳其痛如刺乃肝血無歸宜逐血充又瞳人被物撞打驚痛昏暗眼眶停留瘀血宜貼地黄膏次服決明散如撞刺生翳經久復被物撞轉加昏暗者難治經効散救之又飛絲砂塵入眼瞳人不安單瞿麥爲末鵞涎調敷或新筆蘸京墨點之又湯泡火燒瞳痛若不可用冷藥即點待一日後以五行湯温洗及地黄膏敷之○風症則瞳人青或瞳人連眥頭皆痒不能收瞼乃膽受風熱宜防風一字散○一不治症瞳人乾缺痛澁無淚或白藏在黑水下向白細視方見或兩眼相傳疼痛早輕夜重或内障五色相間頭痛無淚日中如坐暗室或雷頭風熱毒氣衝入睛中牽引瞳人或微或大不見

八廓寄位始有名

乾爲天廓位兩邊白睛中間屬肺與大腸坎爲水廓位瞳子屬腎艮爲山廓位神光屬膽震爲雷廓位白睛上截向小眥屬小腸巽爲風廓位烏珠瞳人外屬肝離爲火廓位大小眥屬心與命門坤爲地廓位上下瞼屬脾胃兌爲澤廓位白睛下截

向大背
屬膀胱

婦人小兒大同耳

婦人活血爲主有孕忌用麝香
小兒眼患多是胎毒及食毒內
服敗毒散外洗解毒湯切忌撥鐮針灸○小兒初生胎風
變目紅而腫邊赤爛至三四歲不愈宜消風散桑白皮煎
湯下又小兒通睛欲觀東邊則見西畔若振掉頭腦則睛
方轉此肝受驚風宜牛黃丸又小兒眼胞患瘀瘡熱氣衝
透睛中疼痛淚出翳如銀片腫澁難開宜紫胡散神醫散
又小兒臉中初生如麻子日漸如豆懸垂臉內乃風熱攻
脾宜五退散加減又小兒痒眼初起澁痒久生瘡翳腫痛
乃肝風所衝或痢後脹熱上攻者俱忌熏宜還睛散瘡磨
眼誤疹痘○小兒不治疳痢中受風五臟不和嘔吐黃汁
兩眼青盲不明及初生觀物近看轉睛不快至四五歲瞳
人結白皆
蒙不見

暴赤腫痛澁且痒

或飲食積熱或天行赤目長
幼相似或傷寒後餘熱以致
血熱痰壅則目暴赤腫痛爲熱痒爲風澁爲毒不可驟用
凉藥因成內障亦不可誤用溫藥助熱致令昏澁眵淚努
肉攀睛等狀是成外障決明散主之又有轉覺目赤腫良
久無事者血復散於四肢也宜地黃粥又或讀書針刺過

度而痛者名曰肝勞但須閉目調護又中惡祟疰痛翳膜
如針刺或如火灸及太陽穴痛早輕夜重宜決明散
眵昏總是表 暴赤後熱流肺經輕則朦朧而已稍重則生
雲膜如黃膜從下生而上衝黑睛痛澀難開
乃脾受風食毒可治如赤膜從上生下遮覆黑睛名垂簾
膜乃客熱上衝也難治又重則生翳障狀如珍珠碎米紅
色自下而上者易治狀如梅花葉白綠自上而下者難治
治法宜先去翳而後清熱若先去熱則翳難去○眵淚熱
而交流兩瞼赤者屬肝熱之甚或衝風淚出由熱甚而水
化制之也又肺受風寒遇風冷則流淚尤甚者白薑僵蠶散
風淚不止食後吞當歸龍薈丸數粒○目昏者熱鬱也甚
則平白目無所見故傷寒病熱極則目盲而不識人目微
昏者至近則轉難辨物或如隔簾視或視如蠅翅或見黑
花皆目之玄府閉密而致榮衛精神不能升降故也若患
風疹者必多眼暗攻其風則暗自去○抑論脾家受毒則
眼白赤腫神昏則眼睛亦痛心熱則血灌瞳人傷風則淚
亦出虛煩則眼亦昏勞力則眥亦赤生瘡
乃風熱侵肺黃乃酒傷於脾最宜活變 **裏虛昏昧最甚**

明上虚属肝虚必頭暈目眩耳聾下虚属腎虚必眼花睛痛耳鳴○昏花者傷氣昏暗者傷血熱症亦有毒朗相目但内虚全不敢近陽光

内障黒花瞳散杳

内障皆蒙外無翳膜因脳脂下凝為珠轉白或如金色或菉豆色或如雲烟或見五色治此外障更難如脂凝結瞳人反背者不治○黒花者腎虚也五色花為腎虚客熱青花膽虚紅花火盛○散杳者瞳人散大視物杳冥

近視陰虚遠視陽

能近視不能遠視者看一成二属肝腎虚宜腎氣丸地芝丸或加降火之劑○能遠視不能近視者属心虚宜定心丸

涙冷睛疼多縹緲

有肝虚客熱迎風冷涙者帰葵湯古木賊散○睛疼有火者滋腎丸無火者杞苓丸

外因風熱濕挾痰

外内風則胞白両眼拘急牽引喎斜痒而青涙肝風毒菊花散腎風毒白蒺藜散明目流氣飲撥雲散白蒺藜散防風一字散犀角飲選用○熱則珠突胞硬腫紅刺痛洗肝散洗心散還睛散通肝散瀉肝散決明散羚羊角散蔓荆散加味荆黄湯瀉青丸京膽丸墜翳丸選用○濕則食蔵身倦地氣冒明如雲霧掩冒或

忽然不見或暑見不明宜益朮散單蒼朮膏濕熱甚神
芎丸○暴寒則目輞不明皆熱所為也人參敗毒散痰者
升麻葛根湯○歷考眼科無寒而有虛豈寒生血而內傷氣
不上攻耶○挾痰者則痛甚宜小省風湯南星丸

血精神少

內傷七情氣壅朦朧胞腫而軟酸澁微赤木香
流氣飲加川芎蒺藜風與氣搏痒澁淚多者
羗活石羔散故因過思勞神大志丸育神夜光丸因驚怒者
定志丸因怒者當歸龍薈丸○內傷飲食勞倦損胃氣
火盛血脈沸騰益氣聰明湯磁砂丸還睛丸氣弱甚者單
人參膏補中益氣湯如脾胃熱兼有宿食者秦艽大黃為
末砂糖調服利之脾胃濕傷內外障翳撥目丸搖蕊散為
熱酒胃氣汚濁血死目盲者蘇木煎湯調人參末連鼻與
手掌紫黑者四物湯加桃仁紅花蘇木煎湯調人參末服
○內傷色慾腎氣虛者補腎丸腎精虛者益陰腎氣丸肝
血虛者養肝丸生熟地黃丸肝腎虛者駐景丸○神論五
臟六腑精華皆稟於脾注於目故理脾胃則氣上升而神
清也又肝之系雖總於目而照徹光彩實腎精
心神所主故補精氣安神者乃治眼之本也　風熱兼虛

亦有之熱久復傷爲風冷所乗則眼中不赤而弦赤且爛若風與熱并則内外浮赤而痒甚大槩表病肥人多風熱防風黄芩瀉火爲君黄連當歸養血爲臣柴胡升麻白芷消毒止痛爲使白睛紅者加白豆蔻少許痩人血虚宜四物龍膽湯或加羌活蔓荊荊芥玄參山梔仁菊花爲佐○蟲痒肥人多風虚者防風一字散四生散補肝散還睛丸痩人血虚挾風者通血丸明目地黄丸滋陰地黄丸熟地黄丸○通用羌活肝丸久甚者退翳丸活命羌活肝丸

古人只消一火字了眼不過虚實而已白輪變赤火乗肺也肉輪赤腫火乗脾也黒珠五色花翳腎虚火也神光青睛被翳肝脾火也赤脈瘀血貫目[illegible]扁心火自甚也故童子水在上則視明瞭老人火在上則視昏眊實火氣有餘宜前風熱藥中加枳殻杏仁以破氣虚火血不足宜前養陰藥中加知母黄栢以降火黒睛有翳者倍之蓋散有餘之火在於破氣降不足之火在於養陰

陽衰火少却宜温或勞慾過度或凉藥過多以致渾身手足麻木九竅不利兩目緊急青白翳見大[illegible]視物無力者宜補陽湯黄芪湯或加黄栢或當

睛乃經曰壯水之源以鎮陽光滋陰是也非火之主以消陰翳養陽是也今人不分陰陽專以龍腦辛香石藥搽點而不知辛散損明悲夫

外治點洗要手巧

凡暴赤腫血壅氣凝者一時連點三五次亦可如氣血衰虛者宜服藥以塞其源藥水洗之生有雲膜方可用點若無翳膜縱久但可洗之卻忌過用寒藥冷洗冰血服化為水至於針刀火烙古人忌用惟太陽經熱生偷針瘡可刺去血如爛翳用茜草根燒灰燈心草蘸點之須臾大痛以三百節草刮去他如金針撥轉瞳人等法另是一家傳授

○耳

耳聾虛熱分新舊

新聾多熱少陽陽明火多故也宜散風熱開痰鬱之劑舊聾多虛腎常不足故也宜滋補兼通竅之劑脉症以腎為主遲濡為虛浮動為火滑大為風洪濇為氣數實為熱

兩胃怒左相火右

厚味動胃火則左右俱聾忿怒動膽火則左耳聾色慾動相火則右耳聾三者忿怒為多痰火

風濕氣閉可通聾火因膏粱胃熱上升兩耳蟬鳴熱甚則氣閉漸聾眼中流火宜二陳湯加黃柏木通萹蓄瞿麥因酒者通聖散加南星枳殼大黃或滾痰丸○風聾因風邪入耳必內作癢或兼頭痛風熱或因腎者防風通聖散先將大黃酒煨又酒炒三遍後入諸藥俱用酒炒煎服風壅連頭目不清者清神散風虛者排風湯桂星散○濕聾因雨水浸漬必內腫痛凉膈散加羌活防風俱用酒炒或五苓散加陳皮枳殼紫蘇生姜濕痰神芎丸濕熱挾氣木香檳榔丸○氣聾因臟氣厥逆上壅入耳痞塞不通必兼眩暈實人因怒者當歸龍薈丸虛人因思者妙香散憂滯者流氣飲子加菖蒲上盛下虛者秘傳降氣湯加菖蒲虛勞精氣脫難治虛聾因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈嘈而鳴或時眼見黑花陰虛者四物湯加知柏菖蒲遠志或腎氣丸加磁石破故紙兔絲子黃柏陽虛者八味丸益腎散磁石湯○勞聾昏昏瞶瞶瘦瘁乏力因勞力脫氣者補中益氣湯加菖蒲有火者加知柏茯苓因房勞脫精者人參養榮湯加知柏或補骨脂丸如久聾腎虛氣虛絕不聞者難

治耳鳴乃是聾之漸惟氣閉多不鳴便聾風熱鳴者羅壽
湯加生地知母或通聖散痰火鳴甚
當歸龍薈丸挾濕神芎丸或青木香丸腎虛微鳴滋
腎丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下陰虛鹿茸丸停膿
疼皆風熱湊停耳原有油液風熱搏擊結核鳴聲聾者外
用生猪脂地龍鍋煤等分葱汁和丸棗核大
綿裹入耳令潤挑去重者内服柴胡聰耳湯○膿耳風熱
上壅流膿外用枯礬五分陳皮胭脂俱燒灰各二分麝一字
聾為末吹耳重者内服犀角飲子○耳疼如蟲走者風盛
乾痛者風熱或屬虛火有血水者風濕外用蛇退燒存性
為末吹入或枯礬末亦可疼甚用吳茱萸烏頭尖
大黃搗爛罨足掌心重者内服東垣鼠粘子湯大要調氣
與開關竅腎水竅耳而能聞聲者水生於金也肺主氣一
身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣開
鬱閉用磁石羊腎丸開竅蓋聾皆痰火鬱結非磁石鎮墜
烏桂椒辛菖蒲辛散流通則老痰鬱火何由而開然亦劫
劑也愈後以通聖散和之可也外治暴聾亦可透暴聾用甘遂為丸塞耳
内服單甘草湯稍久用

松香五錢溶化入巴豆廿粒葱汁搗丸綿裹塞耳左聾塞右右聾塞左雙聾次第塞之○凍耳用欖核燒灰油調搽茹爛貝母末乾糝○百虫入耳用清油灌入口吸氣久自出如蜒蚰入耳用信花雄黃各一錢為末先用三字點耳中次用猫尿灌之取猫尿以生姜擦牙自出又方用琴絃一段將絃頭畧軟二八分蘸黏膠入耳粘出先卧不宜厚被覆塞耳氣久則不通故養生者常摩耳廓以防聾也

○鼻

鼻塞須知問久新

鼻竅於肺而能知香臭者心也人身水升火降榮衛調和則鼻司呼吸往來不窒息而已苟或寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清道則香臭不知新者偶感風寒鼻塞聲重流涕噴嚏宜以風寒治之九味羌活湯參蘇飲消風百解散久則畧感風寒鼻塞等症便發乃肺伏火邪鬱甚則喜熱惡寒故畧感冒而内火便發宜清金降火兼通氣之劑凉膈散加荊芥白芷或川芎石羔散又有不必外感四時鼻塞乾燥不聞香臭宜清金

降火消痰之藥清氣化痰丸、上清丸、古方鼻塞甚者御寒湯澄茄丸。不知香臭者通氣湯、内有硬物者辛夷南星飲貼顖鼻攤餅、外用石菖蒲皁角等分爲末綿包塞鼻仰臥片時、風寒者通竅丸。

久成齆衂淵流津

鼻乃清氣出入之道、清氣者胃中生發之氣也。鼻塞久則氣壅不轉熱鬱於腦清濁混亂爲齆爲衂爲淵。○齆者鼻流清涕熱微、二陳湯加芎歸細辛白芷防風羌活桔梗等分薑煎入薄荷少許。久不止者芷荑散去薄荷加荊芥黄芩神麯南星半夏等分食後煎服。外用細辛膏。○淵者鼻流濁涕熱盛、金沸草散倍黄芩入鳳凰殼一枚燒存性調服。肺風消風散加髮灰。肺火流涕咳吐膿血桔梗湯人參平肺散。○膽移熱於腦濁涕流臭防風通聖散加薄荷黄連或芷荑散。外用蒼耳根莖苗子燒灰醋調塗鼻内。○有流臭黄水者甚則腦亦作痛俗名腦砂、有蟲食腦中、用絲瓜藤近根五尺燒存性爲末酒調服、虛者川芎散。外用白牛耳毛、橙葉等分爲末吹鼻中。倘有血出加山梔亦不妨。○衂者鼻流清血、鼻淵久則必衂。防風散主之。詳後衂血。

傷酒鼻齄傷熱瘡

鼻齄紅也甚則

紫黑因飲酒血熱入肺復被風寒鬱久則血凝濁而色赤或不飲者乃肺風血熱俱宜四物二陳湯去半夏加紅花黃芩水煎入酒少許調五靈脂末服氣虛加黃芪當宜服单山梔丸或黃連阿膠丸臍用升麻和氣飲香鴻青丸以除病根外用黃連末天吊藤燒灰桐油調敷或硫粉散○鼻痛因風邪入鼻與正氣相搏鼻道不通故痛藿香正氣散祛風通氣散有痰火衝肺者鼻隔隱痛二陳湯加黃芩山梔桔梗麥門冬

鼻瘡鼻痔熱同因

輕爲鼻瘡重爲鼻痔皆肺熱也鼻中生瘡者枇杷葉煎湯候冷調消風散食後服忌煎炒姜蒜熱物外用辛夷爲末入腦麝少許綿裹塞鼻○鼻痔肺氣熱極日久凝濁結成瘜肉如棗滯塞鼻竅甚者又名鼻齆宜防風通聖散加三稜海藻末調服外用辛夷爲君細辛杏仁少許爲末和羊髓猪脂熬膏候冷入雄黃白礬輕粉麝香少許爲丸綿裹塞鼻數日卽除甚者加硇砂少許或瓜蔕散亦效又食積熱痰生痔者单蒼耳丸內服外敷最消食積或用白礬二錢細辛一錢白芷五分爲末塞鼻

疎風降火眞要法

風寒外感者溫以散之風熱有自內鬱者

或外感久則鬱而為熱或內因飲食衣服
過度肝熱生風亦鼻塞流涕宜降火清金久宜養血補腎
眞
凡鼻涕臭淵鼽久甚不愈者非心血虧則腎水少養血
則血生而火自降補腎則水升而金自清雖鼻瘡痔久
亦宜又鼻塞久不愈者必內傷肺胃清氣不能上升
非外感也宜補中益氣湯以和之此皆治本之論

○口 舌唇

口病有熱亦有虛心主舌脾主唇口然心脾二氣恒相通也心勞味厚病根株

心貴安靜七情煩擾過度則心火炎盛加之飲食厚味積
熱而口生瘡或臭苦心若屠角現舌膏心勞味厚者氣出
腥臭唾涕稠粘口乾舌燥瀉白散加桔梗知母麥門
冬黃芩五味子痰熱盛者薄荷煎深者五福化毒丹熱極

偏勝口糜爛熱甚一臟偏勝則口味失常心熱口苦生瘡涼膈散黃連阿膠丸肝熱口酸而苦小柴胡
湯加龍膽草青皮甘草甚者當歸龍薈丸謀慮不決膽虛
口苦人參遠志茯神甘草為君柴胡龍膽草為使甚者腎

氣丸脾熱口甘或臭瀉黃散四順清涼飲甘露飲三黃丸肺熱口辛甘桔湯瀉白散腎熱口鹹滋腎丸然肝移於膽則口亦苦木乘脾則口亦酸胃熱或淡或甘脾化火則苦而甘要之熱勝則苦寒勝則鹹宿食則酸須辨虛則淡疸則甘勞鬱傷肺則口臭○口糜膀胱移熱小腸鬲溢虛熱口瘡糜爛者柴胡地骨皮等分水煎服甚者加硝黃心胃壅熱水穀不化者導赤散合四苓散加熱盛并大便不通臍痛喘急口瘡潰爛者瀉白湯血熱者雞蘇丸中虛炎上亦難痛口瘡久不愈服涼藥反甚者乃虛炎上攻秘傳降氣湯呑黑錫丹二十丸陰虛者四物湯加知柏或補陰丸年久不愈者黑參丸

外治仍分瘡赤白

口中瘡赤者心熱用柏礬末摻之或噙良久水漱又噙○口中瘡白者肺熱用黃柏蓽撥等分為末醋調搽水漱○口瘡赤白者心肺俱熱用玄胡索一錢黃柏黃連各五分青黛陀僧各二錢為末頻摻之或單文蛤末亦好夏月西瓜水徐徐飲之○虛炎口瘡者甘草乾姜和勻細嚼嚥之○上熱下寒者黃連乾姜等分嚼且服之○口

牙齒瘡用山梔去仁填白礬入柳葉火中煅爲末吹入口中。○口吻生瘡自爛者檳榔燒灰入輕粉少許乾摻。○小兒口瘡不下食以欲惑治之必死用白礬煎湯浸脚半日頓寛更以黄栢姜蠶爲末敷之。○口瘡疼痛用巴豆半枝生研和米飯一豆大作和貼印堂當眉間約半刻許覺紅就去不可泡起小兒減半用之

穢氣含香暫可除

虚火鬱熱蘊於胷中乃作口臭因與前同外用川芎白芷等分爲末丸含化或香附子亦可

舌病内外因可詳

心之本脉繫於舌根脾之絡繫於舌兩傍肝脉循陰氣絡於舌本腎之津液出於舌端分布五臟心實主之故曰諸經皆會於口

外因強短内腫長

外感風寒傳經者則舌腫自白而黄而黒者死卒中者則舌強而短舌巻不言若死大本類風用小續命湯寒用理中湯熱用甘桔湯加防風枳殻黄芩風寒濕舌強者用白礬肉桂末等分安舌下或四巻一葉正舌藥。○内因七情氣鬱腫滿不得息者金沸草散又不愈者黒参丸外用百霜塩散因怒者单繞鉄粉塗之。○舌腫満口氣不得吐者名木舌用陳茶陳白梅入巴

豆七枚同搗成膏薄荷水調刷口中得上咽片時即下
二行以粥補住如生瘡連顋頰腫者玄參升麻湯○舌腫
滿口不能聲飲食不通者名重舌用蒲黄頭刷舌上自退
如一不能嚥藥即以黄連濃煎時時呷之以瀉心火○舌腫
如猪胞者以針刺舌下兩傍大脉血出即消切勿刺中脉
令血不止誤刺以火燒銅筋烙之血再不止者死或醋調
鍋煤敷舌上下既去再敷須臾自消不食者亦死○舌腫
舌下有蚕如蛞螻卧蠶頭小自有毛可燒鐵烙烙舌頭上
即消○舌長過寸火淡黒一二點宜以生姜蜜水洗
者单米片末敷之腎虚色紅後用補腎兼痰火藥
肺痰脹痰熱舌強並腫肝衄肝熱舌出血如泉心脾裂作
或兼甘露飲单槐花末糝之
瘡心熱生瘡破裂单黄連煎湯服脾熱舌胎乾澁如雪薄
荷蜜氷蘗丸心脾熱者升麻葛根湯加薄荷黄芩桔梗
唇屬脾家病幾般風瞤動寒揪縮熱裂乾血虚無色氣瘡
腫繭唇不食瘰癧難繭唇緊小不能開合飲食不得不急
藥治則死外用青皮燒灰猪脂調搽仍

將青皮灰末每一錢酒調服之○又方用亂髮蜂房六畜毛燒灰猪脂調搽或橄欖燒灰或黃栢散○內治實者瀉黃散虛者菊睛丸腫者薏苡仁湯

○牙齒

牙齒屬腎胃大腸牙齒骨屬腎之標也精完則齒堅腎衰則齒豁虛熱則齒動足陽明胃絡脉入齒上縫止而不動喜寒飲而惡熱飲手陽明大腸絡脉入齒下縫動而不休喜熱飲而惡寒飲**腎虛滋陰腸胃涼**多因飲食色慾過度以致濕熱上攻口湧酸水則牙床不清而為腫為痛或出血或生虫動搖黑爛脫落大抵齒齦宣露動搖者腎元虛也宜滋陰補腎八味丸三味安腎丸虎潛丸惡寒熱而口臭穢者腸胃熱也宜涼藥瀉火祛風清胃散**開口便知風與熱**風牙因腸胃原有風邪更襲外風入齒作痛故開口吸風則痛甚羌活散消風散○風熱因外風與內熱相搏齒齦腫痛加之膿汁臭者犀角升麻湯或用石膏一兩火

煨酒淬防風荊芥細辛白芷各五分爲末隨時水煎一二服甚効○風冷入於齒齦不腫不蛀日漸動搖者温風散○熱牙因腸胃積熱開口臭穢難近者敗毒散加荊防升麻石羔或調胃承氣湯蜜丸服如腸胃素積濕熱復被風寒冷飲鬱於齒間作痛者當歸龍膽散○虚熱攻衝齦肉腫痛口舌生瘡宜柴胡地骨皮等分薄荷減半水煎熱漱冷吐或服之亦好○歷年齒痛黑爛脫落必口吸涼氣稍止者乃膏粱濕熱之火也調胃承氣湯加黃連下之或用升麻白芷防風荊芥薄荷桔梗甘草等分水煎服

客寒犯腦痛難當

寒氣犯腦及風邪湊襲腦頂痛齒痛動搖肉脫者白芷湯羗活黑附湯

挾邪毒痰鑽掣血

痰熱毒氣攻注齒痛者外症咳嗽二陳湯加細辛枳殻姜棗烏梅仍以姜黃蓽撥等分煎湯候温以舌浸內涎自流出○瘀血因風熱上攻頭面搏血於齒間與液不消鑽刺掣痛甘露飲加升麻或犀角地黃湯

齦有黑點被蟲傷

凡飲食不能潔齒臭腐之氣淹漬日久兼之風熱上攻齒齦有孔生蟲蝕一齒盡又度其餘至疥瘡蠹皆其種類必殺蟲而後痛止神功丸取

牙宣之因只有二 牙縫流血風熱者消風散加苦磺內服外擦腎虛炎者四物湯加升麻或牡丹皮知母黃柏陰虛氣鬱者四物湯加香附側柏葉牛膝外敷綠袍散或香鹽散常擦變骨蝕風出血骨露者玉池散齒齦出血多者用生竹茹二兩醋煮含之 走馬疳參小兒方溺白散 外治必兼辛溫藥 牙痛本因濕熱標被風冷所鬱故內服辛涼以治其本外宜辛溫以治其標通用擦牙方謝傳笑去散腎虛胃熱方風蟲牙疼方延年方劫痛方烏鬚瀆固齒方消齒雜法取牙不犯手方 擦牙先須擦牙床 凡遇日月蝕未平時勿進飲食誤食多患齒疾養生家晨興叩齒永無齒疾已上五岳并咽喉謂之雜科

○痛風

痛風歷節分怯勇 形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其循歷遍身曰歷節甚如虎咬曰白虎風 痛必夜甚者血行於陰也 痛多兼腫或不腫 腫多痰火腫多風濕然瘀

火雖內因六慾七情或病後亡津血熱已自沸騰亦必暑
感外邪而後發動骨節痛極久則手足蹉攣風濕雖外因
涉冷坐濕當風取涼然亦必血熱而後凝濇污濁所以
作痛甚則身體塊瘰痰久風濕全者古龍虎丹主之詳

分上下與遍身　傷寒遍身節痛乃風寒侵入肌骨雜病遍
身痛者乃風痰壅滯二陳湯加南星羌活
蒼朮白芷酒芩竹瀝姜汁或挾瘀血者再加桃仁紅花濕
痰瘀血遍身兩脇走痛者控涎丹加桃仁泥為丸或小胃
丹下之如半身不遂及左右手足蹉攣者烏頭湯微汗之
虛者補仙丹詳中風門○上體痛者宜祛風熱豁痰二陳
湯主之痰熱客太陽頸項強動則微痛者加酒芩羌活紅
花濕痰鑽注肢節痛者加二朮威靈仙乾葛黃柏羌活白
芎結腸股臃腫者倍加黃芩濕痰橫行手臂痛加南星蒼朮
酒芩香附威靈仙臂重難舉者加二朮羌活桂枝威靈仙
黃芩臂軟難舉者加南星枳實木香姜黃如臂痛不能舉
或連指掌腫痛者舒經湯肩忽痛者小柴胡湯去半夏加
防風當歸生地大黃黃連滑石肩背痛因食積者單龜板
為丸姜湯下肩臑痛者用龜板一兩側柏葉香附各五錢

白芥子詩凌霄花各一錢半為末酒糊丸四物湯加甘草陳
皮煎湯下背心常一片氷冷者導痰湯合蘇子降氣湯○
下體痛者宜流濕行氣四物湯主之陰虛臂尖痛者膀胱
有火加知母黃栢及桂少許有痰合二陳湯加澤瀉前胡
木香為引痛甚加乳香沒藥熱者合大承氣湯下之兩腿
痛者加牛膝陳皮吞加味三妙丸兩腿痛甚素虛性急或
痢後血流經絡作痛者加桃仁牛膝陳皮甘草姜汁煎熟
調服行散如兩腿間忽一二點痛入骨不可忍者用芫花
根為末醋調敷痛處以帕緊札產後有此疾者亦宜兩足
痛者當歸拈痛湯○凡痛風丸散佐使在上加羌活威靈
仙在下加牛膝防已木通黃栢在手臂加桂
枝引至痛處如遍身痛者則問所起處加之風毒髓痛共
一種痛風百節酸疼無定處久則變成風毒痛入骨髓不
移其處虎骨散麝香丸如赤腫灼熱者敗毒散肢節
腫痛挾濕熱者麻黃赤芍湯主之濕痛如脫風汗黃外因濕症腫滿身痛
如脫者除濕湯寒濕
鬱附子六物湯挫虎丸濕熱者五苓散加蒼朮防風羌活
白芷黃栢竹瀝姜汁走注者四妙散肢節腫脉滑者加南

星木香檳榔蒼朮黄栢防已○濕氣背傴僂足攣成痿者用甘遂一錢爲末入猪腰内煨食之上吐下瀉○風症貴汗出斷面微紅掣痛熱者防風通聖散或小續命湯去附子加羌活黄芩虚者烏藥順氣散獨活寄生湯上體金剛丹下體換腿丸○風中肩背太陽氣鬱不可回顧或肺氣欝熱小便數而欠伸宜通氣防風湯羌活勝濕湯○風濕相搏痛者并伖子丸神仙飛歩丹龍虎丹活絡丹乳香黒虎丹活血應痛丸○風濕毒生瘡者單蒼耳加羌活防風十分之二爲末蜜丸梧子大每百丸酒下或單豨薟丸一斤加四物湯料各五錢防風羌活各三錢川烏一錢半爲末蜜丸空心茶酒任下○風寒濕熱成痺臂髀腰脚骨熱疼痛行歩艱難者二炒蒼栢散等分加虎脛骨減半爲末水調服

暑熱煩疼寒掣骨髓

暑濕相搏面赤尿赤者五苓散合敗毒散加當歸赤芍或復元通聖散○結陽肢腫熱毒流注大便閉者犀角湯○寒症肢節掣痛小筋急痺者五積散合順元散加麝一蠻鶴膝痛者五積散加松節杉節骨髓痛者虎骨散

七情刺痛食停痰

内因七情肢節胷脇刺痛初必眩暈

自汗二陳湯加香附枳殼木香如腰背氣動發痛者枳芎散流氣飲子俱加葱白煎服後臥少頃妙如思慮傷心痛從背起至胸脇者用人參四分木通二分煎湯吞當歸龍薈丸○飲食積痛風初必胃脘嘔吐二陳湯加烏藥枳殼或平蒼耳丸因食厚味積痰流胃髀樞左右發痛一點延及膝骭腫大惡寒夜劇者潜行散爲主加甘草梢蒼朮犀角川芎陳皮牛膝木通白芍入姜汁煎服病稍減去犀角加牛膝龜板歸身尾冬月加桂夏加黃芩又有遍身遊走痒痛狀如虫嚙遇痒而進飲食則虫亦饜飫其間庶不致頻頻嚙也宜麝香丸○留飲四股歷節氣短脉沉久則令人骨節蹉跌恐爲癱瘓宜導痰湯加減痰飲者古半硝丸氣短倦怠者六君子湯加南星○酒濕痛者用黃柏威靈仙各一錢五分蒼朮二錢陳皮芍藥各一錢甘草三分羌活二分水煎服

血氣虛勞不榮養關節腠理

血虛四物湯加龜板秦艽有火者調潛行散有瘀血者加大黃桃仁紅花微利之性急發熱者加酒芩黃柏股節腫痛麻痺者加桃仁歷年不愈者倍加木通出汗或發汗服即愈若不愈者痛風丸二妙蒼柏散三妙丸○氣虛歷節

痛如搥鍛者四君子湯加桂附白芍○血氣俱虛挾痰火者八物湯加羌活防風黃栢龜板○勞傷者趂痛散血風丸拯勞散陰虛者虎潛丸補陰丸

治須流濕與踈風

痛風因外風熱風濕得者初起與傷寒相似宜八分表裏治之表症九味羌活湯氣虛表實骨節痛者六一散加香附黃芩水煎或姜汁糊丸服○裏症五積交加散加大黃痰濕熱者蒼朮丸病愈後大便閉結虛者麻子仁丸骽痛不可忍者用槲寄生焙乾浸酒常服微醉○通用史國公浸酒方萬應膏

調內活血和氣爾

屬內因者宜消瘀血養新血兼理痰火則血自活氣自和痛無不止又不愈者間用升降之劑或專養血補脾如久痛及亡血產後病此者俱不宜純用風藥燥血

○痺風 附麻木

五痺皮脈肌筋骨

痺者氣閉塞不通流也或痛痒或麻痺或手足緩弱與痿相類但痿屬內因血虛火盛肺焦而成痺屬風寒濕三氣侵入而成然外邪非氣血虛則不入此所以痺久亦能成痿又痺爲中風之一

但純乎中風則陽受之痺兼風寒濕三氣則陰受之所以爲病更重觀宋明醫錢仲陽自患周痺偏廢不能全愈可見

上多風濕下寒濕 經言春爲筋痺夏爲脉痺仲夏爲肌肉痺秋爲皮痺冬爲骨痺言皮脉肌筋骨各以時而受風寒濕之邪也大槩風濕多侵乎上肩背臂木手腕硬痛寒濕多侵乎下脚腿木重若上下俱得身如板挾脚如石墜須分風寒濕多少治之風多痛走不定寒多掣痛遍身拘急手足冷痺與痛風無異濕多浮腫重着一處不移○風多烏藥順氣散三痺湯越婢湯單[illegible][illegible]丸○寒多五積散加天麻附子或蠲痺湯寒濕五積交加散○濕多川芎茯苓湯當歸拈痛湯防己黄芪湯羌活勝濕湯續斷丸○又冷痺身寒不熱腰脚沈冷即寒痺之甚者三痺湯合三五七散或舒經湯附子理中湯○又熱痺或濕生熱或風寒鬱熱身上如鼠走唇口反縱肌肉變色宣明升麻湯○風寒濕熱痺二妙蒼柏散等分加虎脛骨防風減半水煎服

皮頑脉濇症多頑肌肉不仁筋骨屈 風寒濕三邪交侵在皮則頑不自覺遇寒則急遇熱則縱應乎肺其症氣喘煩

痺在脉則血滯六脉縮而緊面無色應乎心其症心煩上
氣嗌乾善噫在肌肉則四肢不仁應乎脾其症怠惰嘔吐
在筋則屈而不伸應乎肝其症夜卧多驚溺澁心腹痛在
骨則重而不能舉尻以代踵脊以代頭應乎腎其症心腹脹
痛初入皮膚血脉邪輕易治留連筋骨久而不痛不仁者
難治久久不愈五痺復感三邪入五臟卧不起床渇多食
少亦如中風入臟者死

袪邪後分氣血痰

初起強硬作痛者宜疎風豁痰流動者宜流濕行氣
久病須分氣血虛實痰瘀多少治之○氣虛痺者關節不
充一身如從水中出陽虛陰盛也四君子湯加肉桂生附
或川附丸○血虛痺者皮膚不仁宜防風湯或黄芪建
中湯去飴加桂枝○挾痰血者四物湯加桃仁紅花竹瀝
姜汁○挾痰者手足麻痺多睡眩暈濟生茯苓湯或二陳
湯加竹瀝姜汁○腎脂枯涸不行髓少筋弱凍慄攣急者
十全大補湯地仙丹○通用五痺湯擦痺法

補早反令經絡鬱

初病驟用參芪歸地則氣血滯而邪鬱經絡不散虛者烏頭粥行濕流氣散主之

麻屬氣虛木痰瘀

此槩言之耳有因虛而風

寒濕二氣乘之麻木并作者有氣血俱虛但麻而不木者蓋麻猶痺也雖不知痛痒尚覺氣微流行在手多兼風濕在足多兼寒濕木則非惟不知痛痒氣亦不覺流行常木爲瘀血得氣間木爲濕痰總皆經絡凝滯血脉不貫謂之不仁或兼痰火則肌肉瞤動不可誤作風治○週身掣痛麻木者謂之濕痺乃肝氣不行也宜先汗後補黃芪湯○開目麻木熱退閉目甚者升陽和中湯○皮膚麻木者補氣湯○手足麻氣虛者補中益氣湯去當歸陳皮加五味子白芍生甘草虛甚挾風者補中益氣湯正料加烏藥附子羌活防風天麻○十指麻木胃有濕痰死血者二陳湯加二朮紅花桃仁少加附子以行經○左手脚腿偏麻疼痛右口角併眼牽引側視着表有風也宜天麻黃芪湯○兩腿麻木者導氣湯○兩脚麻木如火熱者二妙丸

治同痺風戒酒醋

凡味酸傷筋則緩味鹹傷骨則痿令人發熱變爲痛痺麻木等症愼疾者須戒魚腥麪醬酒醋肉屬陽助火但可量與若厚味過多下必遺溺上必痞悶先用二陳湯加芍藥黃連降火然後用本症藥

○斑疹 附赤白遊風

斑疹屬火有三因

斑屬三焦無根之火疹屬心火其上侵於肺則一也外因初起頭疼身大熱口知味者忌大汗下宜解肌微汗有自吐瀉者即內因頭或微疼但手心熱脾胃虛者宜大補以降其火體弱者宜清肺以化其痰

斑勢掀發如錦紋

有色痕而無頭粒重者紅如錦繡成片多發在胸腹傷寒誤溫誤下心火所主雜病全是風熱挾痰手少陽相火自裏發外治宜安裏藥多發表藥少○外感者敗毒散加紫草或升麻葛根湯加玄參咽痛者玄參升麻湯狂言或見血者陽毒升麻湯渴者化斑湯便閉者防風通聖散微利之便不甚閉去硝黃身疼加蒼朮羌活痰嗽加半夏熱甚者黑奴丸斑爛者黑膏○內傷發斑輕如蚊迹疹子者多在手足初起無頭疼身熱乃胃虛火遊於外宜調中益氣湯黃芪建中湯○內傷痰熱上攻頭面者升麻葛根湯加玄參貝母黃芩生地麥門冬○內傷挾外感者調中湯參蘇飲

疹隱發痒無腫痛

疹有頭粒或如

粟米或如蚊虫咬迹微紅或隨出隨没或没而又出紅腫隱隱皮膚表分欲出不出但作搔痒全無腫痛名曰癮疹斷春發在傷寒最重即溫毒也升麻葛根湯加牛蒡子荊芥防風或鼠粘湯

出如粟米赤白分

赤疹因天熱燥氣乘之稍涼則消川芎茶調散人參羌活散胡麻散裏熱者解毒湯　白疹因天寒冷氣折之稍暖則消犀角散裏虛者理中湯　似赤似白微黃隱於肌肉之間四肢重着此風熱挾濕也多因浴後感風與汗出解衣而得宜消風散寒加官桂暑加黃芩柴胡濕加蒼朮茯苓如肢體不仁者黃芪檳皮湯遍身疹多痛極者古甚皂丸又有斑疹並出者不可驟用風藥恐變痰嗽涓嗌蒼疹　面生紫赤癮疹及小兒斑汗斑皆此類之變者

五色血毒風火熾

疹色赤者又名丹疹或遍五色因血盛熱毒蓄於命門被風毒逐動相火則發痛遍身甚則肌爛寒月升麻葛根湯暑月人參羌活散熱加黃芩玄參冷加黃芪白芷詳小兒門玉樸散浮萍湯

黑而入腹最傷人

凡斑疹赤色身暖自胸腹散四肢者吉黑色身涼自四肢入腹者死　舊分癮疹

丹疹各類今合一以其因治同也

赤白遊風屬肝火 面皮頭項身體皮肉變色赤者謂之赤癜白者謂之白癜乃肝風搏於皮膚血氣不和所生○赤屬血血熱者九味羌活湯加金銀花連翹或四物湯加柴胡山梔牡丹皮虛者逍遙散加山梔或腎氣丸○白屬氣熱者敗毒散或小柴胡湯加防風連翹虛者補中益氣湯加羌活防風如果係風毒者胡麻散单蒼耳丸单浮萍丸此疾久者只宜滋養氣血則火自息風自定痒自止若用祛風辛苦之劑則肝血愈燥風火愈熾元氣愈虛變為難治

虛痒不止血燥 身上虛痒血不榮於腠理致也宜四物湯加黃芩入紫浮萍末調服或单淩霄花為末酒調服遍身及頭上風屑痒者单苦參丸或薄荷蟬退等分為末酒調服○已上斑瘡丹疹瘾癬大同小異諸方通用

△寒類

○咳嗽

咳嗽須分痰與聲痰聲俱有肺脾經咳因氣動爲聲嗽乃血化爲痰肺氣動則咳脾濕動則嗽脾肺俱動則咳嗽俱作然以肺爲主故多言咳則包嗽在其中實者痰稠聲且重虛者聲利痰亦清咳必先審肺脈虛實實者浮大有力若沉而滑則痰氣盛也虛者弦大無力若沉細帶數則火鬱極也外因四氣隨時令風乘肺咳則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而咳參蘇飲加桑白皮杏仁或柴胡半夏湯後用諸咳丸如久咳夜咳冬月咳風入肺竅者宜薰之○寒乘肺咳則胸緊聲啞二陳湯加麻黄杏仁或蘇沉九寶飲華蓋散與生姜丸有寒熱者小柴胡湯又有一種遇寒則咳者謂之寒包熱也解表則除桔梗湯加麻黄防風杏仁陳皮紫蘇木通黄芩如風寒鬱熱夜咳者三拗湯加知母黄芩○暑乘肺咳則口燥聲嘶吐沫六一散加辰砂見血者枇杷葉散○濕乘肺咳則身重骨節煩疼洒淅五苓散不換金正氣散

○大槩春氣上升潤肺抑肝夏火上炎清金降火秋濕熱甚清熱瀉濕冬風寒重解表行痰内傷火鬱勞食情火咳聲多痰少五更咳多者食積濕熱火流肺中瀉白散加知母或古二母散上半午咳多者胃有實火單石羔丸加知母貝母便閉喘渴痰稠者凉膈散改毒散古半夏丸下半午咳多者陰虛四物湯合二陳湯加知母黄栢麥門冬順而下之夜咳陰虛火燥寒熱盜汗遺精見血者四物湯加竹瀝或滋陰降火湯加味二母丸黄昏咳多者火浮於肺潤肺丸以歛之不可純用凉藥通用二陳湯去半夏加貝母瓜蔞青黛山梔黄芩桑白皮○鬱咳即火咳久者乾咳無痰乃腎水焦枯邪火獨炎於肺瀉白散加苦梗爲君以開之久者調中丸虚者腎氣丸不得志者霞天膏加肺燥皮枯瘙痒便閉者結血潤燥生津飲○勞咳五勞虚咳也痰極傷肝咳而左脇痰乳下腥者二陳湯加芎歸芍藥青皮柴胡草龍膽黄芩竹茹或黄芪建中湯勞神傷心咳而咽乾咯血者劫勞散麥授天王補心丹勞倦傷脾咳而氣短無力者調中益氣湯補中益氣湯叫呼傷肺咳而嘔吐白沫口燥聲嘶者潤肺丸人参清肺飲

房勞傷腎咳而腰背痛寒熱者二陳芎歸湯又有一種傳
疰瘵咳即乾咳勞咳久者宜蛤蚧天靈蓋雄黄朱砂之類
須於勞瘵條參之 ○食咳因食積生痰痰氣衝胸腹滿者
二陳湯加厚朴山査麥芽傷生冷以致肺胃不清嘈酸牛
瀉悪風寒者五積散理中湯果攻散傷煎炒熱物者葶藶
散或二母丸加知母貝母傷酒食積者香附瓜蔞青黛丸
○七情臓氣不平則咳久不已則入六腑怒傷肝咳兩脇
下痛入膽則嘔吐苦汁喜傷心咳心痛咽腫入小腸則咳
與氣倶失思傷脾咳右脇引肩背痛甚則不可以動入胃
則嘔吐痰沫長虫憂傷肺咳喘息唾血入大腸則遺糞恐
傷腎咳唾涎腰背引痛入膀胱則遺尿入三焦則腹滿不
欲食始則關於肺終則聚於胃故也宜二陳湯加瓜蔞仁
蘿蔔子加味瀉白散参蘇飲四七湯蘇子降氣湯痰咳胃
團参飲子古橘甘散古橘姜丸加栽二音湯選用
痛水咳悸痰咳痰出咳止胃膈多滿經日秋傷於濕冬必
咳嗽濕在心謂之熱痰濕在肝謂之風痰濕在
肺謂之氣痰濕在腎謂之寒痰惟濕痰入胃上干於肺則
必作咳宜千緡湯潤下丸半瓜丸選用痰鬱肺經咳則涎

多或結胸者二陳湯加枳梗瓜蔞黄芩貝母甚者鶴頂丹痰積流入肺脘久咳不得睡者兜鈴丸久因少動者二陳湯加芩連或清氣化痰丸痰因宿食者化痰丸痰因酒濕者蜂姜丸全因酒者瓜連丸如痰甚能食便閉者小承氣湯下之不能食便閉者厚朴湯或滚痰丸踈導之○水咳因飲茶水停蓄爲涎上湧身熱胸痛怔悸者小青龍湯身寒脇硬者柴胡湯結胸者小半夏湯大便閉者十棗湯小便澁者五苓散詳傷寒水症

瘀血碍氣脹

且腥瘀血咳則喉間常有腥氣輕者瀉白散加生地山梔牡丹皮麥門冬桔梗重者桃仁大黄姜汁爲丸服或因打損勞力傷肺遇風寒則咳或見血紫黑色者四物湯去芎加大黄蘇木爲末酒調服利去心肺間瘀血即止後服人参養榮湯調理○肺脹滿即痰與瘀血碍氣所以動則喘急或左或右眠下邊不得者是四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝姜汁若虚脹喘者单人参膏古百花膏有水停蓄脹者飲水則逆轉不入三白湯加澤瀉桔梗五倍子若因火傷極無水以升而脹者必乾咳無痰訶治勿新久求黎丸含化以訶子有收歛降火之功危哉

其本新咳有痰者外感隨時解散無痰者便是火熱只宜清之久咳有痰者燥脾化痰無痰者清金降火蓋外感久則鬱熱內傷久則火炎俱宜開鬱潤燥其間有七情氣逆者則以枳殼香附順氣為先停水宿食者則以南星檳榔分導為要氣血虛者補之斂之苟不治本而浪用兜鈴粟殼澁劑反致纏綿況肺為嬌臟易寒易熱雖人參平藥惟氣虛最宜若肺熱有火及風邪初盛者俱宜砂參或玄參代之故咳不拘於寒也

久甚還將脾腎寧

久咳曾經利下及勞倦饑飽以致肺胃寒而飲食少進者只理脾而咳自止然腎為氣臟咳嗽動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者乃腎虛氣不歸元宜所服藥中加補骨脂五味子或三味安腎丸陰虛者腎氣丸陽虛者黑錫丹以鎮之凡咳至肺脹及咽瘡失音者必死

○霍亂

霍亂暑濕乾三種

一種暑霍亂即濕霍亂但此疾至秋惟甚縱寒月亦多由伏暑故名一種濕霍

亂有聲有物一種乾霍亂有聲無物治見三卷四十九葉

病本中焦濕熱壅

標因外感四氣或日間感熱夜間受冷或內素鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節或酥酪酒漿生冷以致濕熱內甚中焦脾土失運當升不升當降不降是以上吐下瀉脉多伏絶又有挾七情鬱氣痰涎聚膈痞塞不通者外見痰喘駭暈亦必由傷飲食為之根也

心腹卒痛或熱實

先心痛者則先吐先腹痛者則先瀉心腹俱痛者則吐瀉俱作輕則吐瀉而已凡吐瀉時切不可與穀食雖米湯一呷下咽立死必待吐瀉盡過半日飢甚方可漸食稀粥〇偏陽分則多熱而渴偏陰分則多寒而不渴

痰喘煩渴却可恐

痰喘二陳湯加味半硫丸虚煩不眠既濟湯煩渴九君子湯桂苓甘露飲大渴大燥大汗遺尿者死回生散養正丹救之

轉筋舌卷囊縮危

陽明胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津液驟亡小筋失其所養故輕者兩脚轉筋而已重者遍體轉筋手足厥冷甚者欲絶者倉卒之際宜以鹽填臍中灼艾不計壯數雖已死而胸中有暖氣者立甦急用木萸散

加小茴甘草蘇葉煎服再研生蒜塗脚掌心雖昏危入腹
者亦効如血熱轉筋不已者四物湯加黄芩紅花或蒼朮
南星水藥不入者古拔萃散轉筋不住男子以手挽其
陰女子以手牽乳近兩邊如舌巻囊縮轉筋入腹者死分
利升降消食宂霍亂乃濕熱兼風木爲害治宜散風寒利
濕除火故四時通用藿香正氣散爲散風
寒濕之要藥寒月厥冷脉沈不渴者五積散理中湯古姜
附湯暑月煩渴者黄連香薷散冷服俱宜合五苓散以分
消上下或更合益元散降火尤妙此皆分利法也又當引
清氣上升使濁氣自然下降吐瀉未徹者宜用二陳湯加
芎芷蒼朮防風探吐以提其氣如吐瀉不止宜所服藥中
加木瓜檳榔以降其氣又有可下者但不可純用凉藥挾
七情者七氣湯古參蘇飲傷飲食者紅丸子保和丸俱姜
湯送下通用四君子湯有汗加桂枝無汗加麻黄吐利轉
筋腹痛體重脉沈細加白芍良姜四肢拘急脉沈遲屬少
陰加姜附厚朴吐利轉筋脇痛脉弦者木尅土也平胃散
加木瓜或小建中湯加柴胡木瓜四肢厥冷
脉微緩屬厥陰者小建中湯加當歸附子

○心痛

厥心痛先問久新真心痛因內外邪犯心君一日即死厥犯心之支脈謂之厥者諸痛皆少陰厥陰氣逆上衝又痛極則發厥也○新者身既受寒口又傷冷鬱遏元陽宜草豆蔻丸雞舌香散温散之或神保丸温利之久者寒鬱爲熱或因七情者始終是火此古方多以苦寒瀉火爲主辛熱行氣爲向導也

痛甚發厥有二因寒厥外因風寒客背之血脈背俞與心引痛暴發手足厥逆冷汗甲青似傷寒陰厥古姜附湯三味玄胡散○熱痛內因酒食積熱痰鬱發厥手足雖冷而身熱甚則煩躁吐逆額汗古玄金散二味川楝散荔苓散甚者大承氣湯下之後服枳朮丸

七情怔悸虫不定九種悸痛虫痛來去痛疰痛飲痛食痛風痛冷痛熱痛○悸痛內因七情輕則怔忡驚悸似痛非痛妙香散四七湯小草丸熱者連附六一湯重則兩目赤黃手足青至節即真痛不治○虫痛濕熱生虫攻心痛發難當痛定能食饑則嘔

沫遷擾散烏梅
丸化虫丸選用

痰火來去痛昏神來去痛脇鬱痰火勞心則發熱者梔姜飲鬱甚者

丸痰積白螺殼丸痰火嘈痰丸〇痛卒感惡忤尸注素
虛者腎經陰氣上攻神昏卒倒蘇合香丸痛引背傴僂者
沈香降氣湯或五苓散倍桂韭汁為丸小茴煎湯下
素實者腎火上攻小承氣湯癆瘵尸注者紫河車丹

胃脘脾痛傷飲食腹脹便閉嘔頻頻胃脘當心而痛脾臟連心而痛古方云即心痛蓋厥

痛亦少脾胃痛多且七情四氣歸脾再痛攻脾入胃痰涎
脾胃所主但心痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食胃痛善噫
兩脇咽膈不利脾痛舌強善嘔腹脹二便不通古方寬痛
以黃連治心山梔治胃脾痛以參歸小草治心丁砂豆蔻
治胃亦未嘗混大槩傷水飲聚涎心痛如刺者溫膽湯加
白朮傷食生冷遇熱食鬱散者香蘇散加生姜菖蒲半夏
枳殼或人參養胃湯加肉桂吳茱或木香化滯湯感應丸
凡心痛數日不食無妨痛止恣食即發〇胃火梔姜飲胃
寒烏藥沈香湯上熱下寒者古梔附湯〇脾痛海石散古
二胡散風冷抽刀散蟠葱散虛脾散二炒香良散濕者小

胃丹壹嘔五膈寬中散腹脹厚朴温中湯連脇痛復元通氣散痰滞便閉順氣導痰湯氣聚便閉三和散四磨湯小便閉導赤散又有心脾俱痛者手拈散

外感三般風冷熱連脇腰背必舒伸

風因肝邪乗心痛賍兩脇引小腹陰股桂枝湯加附子便閉人參一匙同煎或分心氣飲加厚朴枳売蘿蔔子木香或阿魏撞氣丸○冷因形寒飲冷目京腎氣乗心痛則心懸若饑腰痛下重泄痢五積散便閉加大黄或肺寒乗心痛則短氣季脇空痛者流氣飲子拈煎散或脾寒乗心痛則腹脹便難者藿香正氣散挾濕者除濕湯○熱因心胞絡暑毒乗心痛徹背俞掌熱黄連香薷散加麥門或牟黄連丸凡諸經心痛引背多属風冷諸腑心痛難以俛仰嘔瀉多属熱

氣血虚勞挾則止

虚痛挾之暫止素虚多勞或誤服攻耗心氣藥多者降氣湯歸脾湯心無血輔者四物湯去地黄加乾姜心氣不足者六君子湯加肉桂氣血俱虚者古歸木散挾痰火食積者一六丸

大實胃高痰飯實

實痛素有痰熱頑痰或因惱怒而發者梔黄丸木香檳榔煎湯下或香稜

丸。大實痛、因怒後飲食卒痛、牢悶、心胸高起、手不可按、便閉者、大陷胸湯。或者、黄丸下之後、服古藁蒼湯、以去餘邪。○瘀血痛、飲湯水嚥下作呃、乃素食熱物、血死胃脘、桃仁承氣湯。輕者、四物湯加桃仁紅花、或玄胡索丸、失笑散。○婦人瘀血入心脾痛甚者、五積散加三稜莪朮。經行未盡血衝心痛、加桃仁紅花。經行已往作痛者、七氣湯加當歸。産後痛者、桂心湯、木檳湯。

化痰消積氣已降

凡痛皆痰粘胃、通用二陳湯。風寒初起無汗加麻黄、有汗加桂枝。裏寒加肉豆蔻。濕熱加蒼朮川芎。熱加山梔、鍋煤、童便。或少加炒乾姜、反佐之。冷加丁香良姜。氣虚加参朮。血虚加當歸。大虚厥逆加姜附。肝火加青黛青皮黄連。痰飲加白螺殼滑石南星。食積加砂仁香附。瘀血加韮汁桔梗。虫痛加苦楝根、或木香檳榔。急痛加胡椒、畧用玳猫炒過。痛不止可急加細茶乳香、或石礦丸。痛攻走腰背發厥嘔吐、諸藥不効者、加蒼朮川芎山梔、探吐積痰碗許乃愈。

刼痛丸丹可入唇

寒者、九痛丸、却痛散。熱者、散痛丸、通靈散。有積、神保丸。瘀血、單乾漆丸。通用、手拈散、如意丹、神聖代鍼散。

○腹痛　附腹中窄狹

腹痛大小分陰陽　大腹痛多食積外邪、臍腹痛多積熱痰火、小腹痛多瘀血及痰與溺澁、臍下卒大痛人中黑者中惡客忤不治○陰症臍腹牽痛自利或嘔喜按少食綿綿不止減宜溫之○陽症腹中覺熱甚則太便閉澁脹痛怕按時痛時止宜下之

寒痛綿綿熱不常　舊以虛痛喜按實痛怕按但寒熱邪有淺深不可太泥經謂寒氣入經客於衛分則血澁急痛按之熱則止寒氣客於榮分則氣鬱滿痛甚怕按寒氣客腸胃募原與絡急引皮痛按之則氣血散而痛止寒氣客夾脊背俞之脉則深按之不能及也寒氣客關元則氣逆上喘寒氣客厥陰脉絡則脇肋與小腹或陰股引痛寒氣客小腸募原之間則血氣凝聚成積寒氣客小腸不聚則腹痛而泄寒氣客胃則腹痛而嘔寒氣客五臟則痛死復生治傷寒腹痛詳三下卷四十八葉○尋常外感胃寒症卒痛吐利俱酸喜熱物熨者五積散加吳茱萸木瓜根葱或藿香正氣散加木香少許風症桂枝湯加芍藥或胃風湯加木香者

症香蘇散加生姜陳壁土紅參木瓜或五苓散濕症除濕
湯或香薷散加蒼朮枳殼積熱者痛時止痛處亦熱手
不可近便閉喜冷宜四順清涼飲
大承氣湯三黃丸老人麻子仁丸**食積有形便後減**食積鬱結
腸胃作痛得大便後則減者宜平胃散加消導藥或保和
丸枳朮丸紅丸子調之或木香檳榔丸大備急丸神保
丸如意丹下之又有食填胸**濕痰溺溢火鳴腸**濕痰阻滯氣道必小
滿心胃作痛者宜大吐之
便不利或二便俱不利宜蒼朮散加清痰留滯胸腹作聲
者檳榔丹小胃丹○痰火痛乃火欲升水欲降相擊腸鳴
者二陳湯加芩連山梔如怒火攻衝痛無定處定時者更
加香附芍藥青皮又有糞結腸鳴作痛不大便者大黃備
急丸之類通之如臟寒冷結腸
鳴者宜分三陰以溫藥治之**蟲痛吐水定能食**蟲痛肚大青筋
往來絞痛痛定能食發作有時不
耳諸痛停聚不散烏梅丸化蟲丸**七情氣痛痞胸堂**七情痛心
胸背痞悶或攻注脇背虛者七氣湯木香勻
氣散木香化滯湯實者三和散分心氣飲**中虛全不思飲**

食。中虛脾弱隱隱冷痛全不思食者人參養胃湯加肉桂吳茱萸木香素氣虛挾痰者六君子湯加蒼朮瘀血

痛必着一方瘀血痛有常處或憂思逆鬱跌撲傷瘀或婦人經來產後惡瘀不盡而凝四物湯去地黃

加桃仁大黃紅花○又血虛鬱火燥結阻氣不運而痛者

四物湯倍芍藥加炒乾姜○凡痛多屬血澀通用芍藥甘

草湯爲主惡寒而痛屬脾腎加肉桂惡熱而痛屬脾胃加

黃芩脈緩傷水加桂枝脈澀傷血加當歸脈遲傷寒加乾

姜臍下痛加熟地惟氣分諸痛不宜芍藥酸收宜

木香檳榔青皮陳皮香附辛散之○努痛手拈散初起虛

溫實宜瀉虛宜辛溫消散燒脾散蟠葱散丁香脾積丸果係沈寒痼冷小腹下痛者酒煮當歸丸經曰結

者散之是也○實宜辛寒推蕩經曰通

因通用痛隨利減是也方與積熱痛同久則朮消理胃房

腹屬塊久病宜和脾胃如脈弦急木尅土也小建中湯加

當歸取芍藥味酸於土中瀉木爲君如脈沈細水侮土也

理中湯取乾姜辛熱於土中瀉水爲君如脈緩腹痛自利

米穀不化者平胃散加肉桂吳茱萸取蒼朮苦辛燥濕土爲

歛

若胃氣下陷者加升麻柴胡蒼朮以升之有積者加山查麥芽枳實黃連木香以消之上熱下寒升降失常腹痛嘔吐者黃連湯主之○疝痛引睾丸痢痛拘急積聚痛有形可按腸癰痛臍生瘡小便如淋脉洪砂症痛甚嘔吐脉沈各條治見

腹中窄狹性偏躁無非痰火養爲殃

腹中自覺窄狹神昏性躁乃濕痰濁氣攻於心脾以致升降失常肥人多濕痰宜二陳湯加蒼朮燥濕香附行氣瘦人多火宜二陳湯加黃連清熱蒼朮流濕心神不歛者俱加遠志麥門冬酸棗仁血氣虛者六君子湯加芎歸養血流濕自然平復

△暑類

○瘧

瘧疾先要陰陽定

陽爲外感邪氣其間陽爲風暑有汗陰爲寒濕無汗陰爲內傷正氣虛其間陽爲氣虛陰爲血虛陽爲升發在春夏陰爲降發在秋冬陽爲腑邪淺與榮衛並行一日一發陰爲臟邪深橫連募原

不能與正氣並行故間日蓄積乃發或三四日一發久則必有瘧母陽爲日發邪淺榮衛晝行背與脊故也陰爲夜發邪深榮衛夜行胷與腹故也又有二日連發住一日者及日夜各一發者乃氣血俱受病也陽爲子時至巳陰爲午時至亥如發寅卯而退於申未或發未申而退於子丑皆謂之陰陽不分須隨症用藥趲早或移時分定陰陽然後陽瘧截住陰瘧升散今俗以似瘧誤治變成溫瘧爲分陰陽謬矣殊不知瘧有凌雪之狀在傷寒久則爲壞症在內傷久則爲癆瘵豈美疾哉凡陽瘧易治陰瘧難愈

陽熱陰寒如期瘧

陽邪與榮争而邪火發於外則爲熱陰邪與衛争而正氣退於內則爲寒衛虛則先寒榮虛則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多表裏相半寒熱相等諸瘧惟食積挾痰寒已復熱熱已復寒謂之寒熱相併又暑瘧單熱濕瘧單寒寒瘧先寒後熱風瘧先熱後寒餘皆先寒後熱陰陽寒熱明而瘧治知本矣

寒瘧太陽熱陽明

寒瘧腰背頭項俱痛屬太陽寒多熱少汗出難已者柴胡加桂湯單寒無汗者五積散古薑附湯熱瘧目痛鼻燥鼓頷屬陽明熱多寒少煩

渇尿赤者柴苓湯暑月黄連香薷散熱傷氣分單熱而渇者白虎加人参湯或黄芩湯加桂少許

風瘧少陽寒熱並

風瘧口苦嘔吐悪心脇痛屬少陽寒熱相半者柴胡桂枝湯風盛筋脉抽搐者烏藥順氣散加柴胡黄芩身疼者敗毒散咳嗽者参蘇飲○已上三陽氣分受病發在處暑前者倶謂之暴瘧乃傷之淺者

少陰四正厥四旁

少陰瘧發於子午卯酉四正之日舌乾口燥嘔吐欲閉戸牖輕者小柴胡湯倍半夏重者合四物湯○厥陰瘧發於寅申巳亥四旁之日小腹痛引陰茹淋輕者小建中湯重者四物湯加玄胡索金鈴子附子

太陰辰戌丑未病

太陰瘧腹滿自利善嘔嘔已乃衰輕者異功散重者理中湯如濕偏陰分單寒氣虚作泄者古薑附湯附子理中湯身重腹脹者五苓散朮附湯浮腫退黄丸○已上三陰血分受病發在處暑後者倶謂之温瘧乃隔冬感温氣藏於腎與骨髓至夏秋重感新邪觸發自臟而達之腑乃傷之重者

瘴瘧山嵐瘴一方

瘴瘧山溪蒸毒令人迷困發狂或啞乍寒乍熱乍有乍無者凉膈散加柴胡枳殻劇不已伏氷

土者入參養胃湯。○疫瘧一方長幼相似須參運氣寒熱用藥大槩不換金正氣散五積交加散加減用之妙

鬼瘧卒感異常性 鬼瘧因卒感尸疰客忤寒熱日作夢寐不祥多生悲怖言動異常宜辟邪丹雄硃丹或用燒人場土爲丸塞男左女右耳中

詳分寒熱汗且和 外感寒多非草菓厚朴不能温散熱多非柴胡黄芩不能清解陽瘧無汗須加柴胡蒼朮葛根甚加麻黄陰瘧無汗須加柴胡升麻川芎有汗須加白朮烏梅以和之

或吐或下須體盛 陽瘧初起痰在上者祛邪丸然亦三五發後形身乃可用之早則延綿難久不敢吐者勝金丹三陰瘧便閉者宜下以截之暑瘧黄連香茹散加大黄青皮烏梅煎服寒瘧二陳湯加青皮良姜煎吞神保丸五粒痰熱留滿便閉者大柴胡湯瘀血發狂好忘者桃仁承氣湯兼用麻子仁丸俱清晨一服取下悪水即止

内傷善食惟七情 内傷瘧皆不食惟七情善食多汗五臟之氣不和畧被外邪動發宜四獸飲量體虚實加各經開鬱行氣之藥

勞瘧微微虚損症 勞瘧微微惡寒

發熱寒中有熱熱中有寒最難調理或半月十日小勞復來經久不瘥者芎歸鱉甲散主之熱多者生犀散有痞者鱉甲丸 ○ 氣虛汗多無力飲食不進者六君子湯因勞役昏倦少食者補中益氣湯加黃芩半夏 ○ 血虛夜發者小柴胡湯合四物湯加升麻紅花知母黃栢水煎露服趲早不愈用勝金丹截之有痞者陰瘧丸 如陰虛火動午後寒熱至晚微汗乃解似瘧非瘧也宜加味逍遙散加地骨皮若誤用瘧藥必死 ○ 氣血俱虛瀕頻食少或遺精咳嗽者人參養榮湯加地骨皮烏梅麥門冬或什麥不瘥者十全大補湯加柴胡黃芩陽虛去柴芩加附子吞黑錫丹有痞者橘皮煎丸

痰瘧嘔沫多昏迷 痰瘧外感內傷鬱聚成痰熱多頭疼肉跳吐食嘔沫甚則昏迷辛悶宜柴陳湯加草菓嘔吐者二陳湯倍白豆蔻流行三焦嘔止瘧自止氣虛嘔者單人參湯或用常山炒過久不止者露薑飲截之

食瘧腹脹寒熱併 食瘧因飲食蘊成痰火寒已復熱熱已復寒寒熱交併苦饑不食食則吐痰胸滿腹脹者二陳湯合小柴胡湯或平胃散俱加枳實白朮山查神麯青皮寒熱者清脾飲寒多者人

參養胃湯腹痛者紅丸子腹脹因濕痰或瘧氣歸腹者古龍虎丹用杏仁煎湯迎發時下久不愈者用辰砂阿魏等分糊丸皂子大每丁丸人參煎湯下截之

清痰斂汗補胃脾

瘧無痰不成內傷脾胃虛寒宜清利濕痰為主內傷瘧皆汗多陽瘧斂以參朮黃芪陰瘧斂以歸地知柏芍藥大抵有汗要止汗以補其虛無汗要發汗以散其邪稍久者一補一發丹久虛補中益氣湯加山查麥芽扶脾自止截忌吐截

利水消痰瘧母淨

凡瘧經年不瘥謂之老瘧必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脇作脹且痛乃瘧母也雖內虛者非常山檳榔不能除但須製熟則不損胃老瘧丸是也血虛者鱉甲丸體盛有水癖者暫用芫花丸仍須以補脾化痰湯藥輔之老瘧飲宜量氣血虛實加減

有時瘧後痢相兼

或瘧後痢痢後瘧或瘧痢併作俱以柴苓湯六和湯清脾飲加減分利虛者補脾和血三白湯加黃連木香當歸砂仁或四獸飲補中益氣湯

總要祛邪與扶正

外感汗吐下解祛邪為主內傷斂補養正為主內外相兼又當參酌抑論經曰夏傷於暑秋必發瘧

又曰諸瘧皆生於風局方主於傷食丹溪主於痰其實因夏傷暑秋感風濕遇七情飲食鬱痰而後發雖三因雜至錯亂氣血然始於暑成於痰故捷徑以祛暑消痰為要○通用二陳湯外感無汗去茯苓加柴胡猪川芎葛根蒼朮太陽加羌活防風藁本陽明加葛根升麻白芷少陽加柴胡黃芩青皮少陰加芎歸黃連黃栢太陰加二朮柴胡此三味瘧家必用厥陰加桂枝姜附渇加知母麥門冬大便閉加大黄杏仁小便赤加澤瀉山梔瘴瘧加檳榔截瘧加常山檳榔貝母內傷無汗加柴胡川芎氣虛合四君子湯血虛合四物湯汗多加黃芪食少加山査麥芽勞瘧加地骨皮鱉甲七情加紫蘇香附痰加南星姜汁食積加莪朮久瘧倍參朮寒甚加桂附草菓夜瘧加升麻柴胡以提之傷水倍半夏瘀血加杏仁紅花○吐瀉不食腷脹者不治

○痢

痢憑色症分熱寒 身熱口渇溺澁大便急痛色赤者為熱　身涼不渇溺清大便順利色白者為寒

但痢因於暑熱者多寒者少然陰陽變化赤而淡者爲寒白而稠者亦爲熱必色證兩參而後寒熱可辨

總因

濕火氣血滯 血因火動濕多成瀉火傷氣分則氣鬱自大腸滯下爲白火傷血分則血瘀從小腸滲下爲赤氣血俱傷則赤白相兼其因有外感暑濕內傷酒麪炙煿消爍或七情氣鬱而爲火之實者有外感寒濕內傷生冷硬物積滯或房慾損傷精血而爲火之虛者皆令腸胃枯澁久積成毒經曰飲食不節起居不時者陰受之則入五臟閉塞下爲飧泄久爲腸澼言濕火滯於腸中故名滯下又云痢者利也法當利下耳

表症頭疼或渴嘔 初起發熱惡寒頭疼身痛帶表症也熱者九味羌活湯寒者不換金正氣散○煩渴多暑者茹苓湯六一散梅蜜飲虛者錢氏白朮散○嘔吐有寒熱者屬半表柴苓湯頑痰在膈者苓連二陳湯加防風桔梗蘆菔吐胃火衝上者清六丸毒滯上攻者平胃散加黃連木香檳榔○虛嘔食少者四君子湯加陳皮厚朴麥門冬竹茹或溫六丸日久陰虛者八物湯合二陳湯加桔梗○嘔吐全不食者謂之噤口胃火甚也大虛大熱香連丸加蓮肉各一半爲

末米飲下。又人參四錢、姜炒黃連二錢、濃煎、終日細細呷之。如吐、再服。但一呷下咽、便開。有毒薰心肺者、取敗毒散加蓮肉、陳米。或單蓮肉留心、爲末。毎二錢、陳皮煎湯下。外用大田螺二箇、入麝少許、搗碎、敷臍中、以太乙膏貼之、引熱下行。間有濫服尅藥及脾胃虛者、參苓白朮散去山藥、加菖蒲。

裏急腹痛後重墜

火性急速、傳下。或化或不化、食物瘀積、欲出而氣反滯住、所以欲便不便、腹痛窘迫拘急、大腸重而下墜、甚則肛門作痛。宜木香檳榔丸、通氣。大黃降火、芩連解毒、歸芍和血、枳殼陳皮行滯。經云、和血則便膿自愈、行氣則後重自除。間有虛火者、參朮歸芎補之。寒痢者、乾姜肉桂溫之。又素有積聚、偶因一臟之氣發動、干犯腸胃成痢者、須察何臟相乘、以平治之。上

熱赤紫黑寒白清

偏熱純赤、見暑症、輕者黃芩湯、重者導滯湯、日久黃連阿膠湯。○熱積紫黑色者、瘀血也。腹痛後重異常、桃仁承氣湯下之。或因誤溫、以致血瘀者、犀角地黃湯加黃連大黃。或加味香六丸、日久地榆散、與苦參丸、黃連阿膠丸。要知諸痢皆血瘀、惟黑爲瘀甚耳。○寒痢白如鴨溏、腸鳴痛墜不甚、不換金正氣散。

加烏梅陳米或熟料五積散茯苓便清六合姜附湯理中湯
日久黄連補腸湯 ○ 冷熱不調赤白各半六合姜墨丸或良
溏作盛似痢非 **濕如豆汁風青是** 濕痢腹脹身重下如豆
汁或赤黑混濁危症
痢古薑連丸
當歸和血散升陽除濕防風湯升陽益胃湯除濕湯豬苓
湯戊己丸 ○ 風痢惡風鼻塞身痛色青或純下清水古蒼
防湯神朮散青色帶白者風寒五積散帶紅者胃風湯青綠
雜色屬風火濕及五色俱下者及脾胃食積及四氣相併
而作古薑連丸救之 ○ 已止好感痢疾如一方長如相似
者名曰疫痢敗毒散加陳皮或姜茶煎以防之更叅運氣
調治 **七情鬱勃食積黄** 氣痢去如蟹渤拘急甚流氣飲子
古薑連丸六磨湯熱者解毒湯加知
母枳殼或木香檳榔丸冷者木香匀氣散黄者黄丸小便閉
者五苓散久不止者氣痢丸 ○ 積痢色黄或如魚腦漿腹
脹痛惡食者保和丸急痛神保丸一切酒食積聚或黄或
赤通玄二八丹傷酒甚酒蒸黄連丸傷水飲脇脹痛者温
六丸體實 **虚勞滑脫多困備** 虚痢困倦穀食難化腹微痛
者薷水丸 或大痛並無努責 ○ 血虚後

紅通玄二百八卅日久四物湯加升麻香附側栢葉○房勞傷精血成毒者腎氣丸虛勞挾痢者香連猪肚丸亦痢經下後痛墜不止裁虛坐努責及久不愈者皆陰血虛也胃風湯去桂加熟地主之○氣虛色白如鼻涕凍膠四君子湯理中湯俱加木香肉桂厚朴茯苓散風邪分水道開胃脘日久者補中益氣湯虛甚厥逆脉微者四順散黒錫丹○滑痢不禁甚則脫肛血分四物湯加參朮地榆樗白皮氣分真人養臟湯大斷下丸靈砂蒼榆湯

惟有休息最難禁

休息痢經年月不止瘥有過服凉藥以致氣血虛者八物湯加陳皮阿膠芩連少許或十全大補湯脾胃虛弱者補中益氣湯參苓白朮散腎虛者四神丸亦右脂丸有熱服溫藥餘毒不止散者古芩朮湯神効丸六神丸有積者通玄二百八卅積消毒散脾胃已和氣血漸復盡然後用百中散以止之若更澁早則纏綿胃敗難救

瘥如肝不可治

蠱瘥痢黒如鷄肝發渴五內切痛乃服五石湯丸通貫真膠其血自百脉經絡而來菁根丸救之亦有宜溫熱藥者○凡痢下如竹筒或如屋漏水塵腐色氣短飽逆者不治或純下血小便不通唇紅

下後身熱脉弦洪者俱不治 初宜通解或分消 通因通用下之也然汗吐亦謂之通初病元氣實者可行若五七日脾胃虚者只宜和解 久乃升提補脾胃 及分利小便消導食積無積不成痢也稍久以氣血藥中加升麻柴胡防風蒼朮以提之久甚乃用粟殼肉豆蔻龍骨牡蠣訶子以澁之飲食少者專調脾胃飲食進而氣血自和蓋痢以胃氣爲本也其間有裏急甚而無表者卽宜通利有虚而不敢通者或和解或卽升舉有氣陷下痢如注者卽暫止澁有滑泄痛甚者痰火盛也宜吐宜升痰消火降而大腸自斂須憑脉症斷之

愈後餘痰却當防 三白湯六神丸枳朮丸太和羹選用 恐成腫痛鶴膝類 有足腫者有徧身歷節痛者俱餘痰留滯經絡不可純用風藥鶴膝風大防風湯五積交加散脚細者蒼龜丸詳見外科

△濕類

○痞滿

痞滿先分便易難 痞與否卦義同精神氣血出入流行之紋理閉密而為心下痞塞按之不痛非若脹滿外有脹急之形大要大便易而利者為虛大便難而閉者為實

外感半表同傷寒 外感邪氣自肌表傳至胸膈為半表裏症宜和解或已經下胸滿而痛者為結胸不痛者為痞滿同傷寒治法

雜病食壅兼養血 雜病食積下之太過或誤下則脾胃之陰損亡以致胸中至高之氣乘虛下陷心肺分野其所蓄之邪又且不散宜理脾胃兼以血藥調之若用氣藥導利則氣愈降而痞愈甚久則變為中滿鼓脹蓋痞皆自血中來但傷寒從外之內宜以苦泄雜病從內之外宜以辛散人徒知氣之不運而鬱用枳梗橫樹而不知養陰調血惜哉〇古方食壅胸中窒塞者二陳湯探吐傷飲食胸痞者枳朮丸食後感寒以致飲食不化者二陳湯加山查麥芽神麯虛寒不散或寬或急常喜熱物者理中湯加枳實稍久鬱成濕熱者平補枳朮丸

痰火氣鬱利膈間 痰火因厚味鬱成痰濕者小陷胸湯或枳梗二陳湯導痰湯火盛者二陳湯加芩連瓜蔞或黃芩利

膈丸用白朮陳皮煎湯下或古黃連丸以瀉肝補脾清濕熱開痞結久痞者黃連消痞丸如痰火濕熱太甚者方敢用三黃瀉心湯加減量下之虛者只宜分消上下與濕同治○七情氣鬱成痞不思飲食食之不化者木香化滯湯或順氣導痰湯

中虛如刺痰碍阻

有稟受中虛痞滯不運如飢如微刺者六君子湯加香附砂仁有內傷勞役濁氣犯上清氣下陷虛痞者補中益氣湯加黃連枳實芍藥便閉加大黃嘔加黃連生姜陳皮冬月加黃連丁香食已心下痞者平補枳朮丸停飲中寒者枳實理中丸○痰血結成窠囊而心下痞者用桃仁紅花香附大黃等分爲末酒調服利之或犀角地黃湯血蓄挾火遏勞則發心下不快者四物二陳湯加桔梗瓜蔞降之氣血俱虛者枳實消痞丸

王道消補總可安

王道消補不輕吐下故古方以芩連枳實苦泄厚朴生姜半夏辛散參朮甘苦溫補茯苓澤瀉淡滲隨病所在調之○通用二陳湯爲主肥人多濕痰加蒼朮砂仁滑石倍茯苓半夏瘦人多鬱熱中焦加枳實黃連乾葛升麻稟受素實面蒼骨露者加枳殼黃連青皮厚朴素虛者加白朮山

查麥芽陳皮。誤下陰虛者，去茯苓半夏，加參朮升麻柴胡枳實，以升胃氣，更合四物湯，以滋陰血。飲食積痞，加枳殼砂仁、姜汁炒黃連。食後感寒，加藿香草豆蔻吳萸砂仁。氣痞痰痞，加木香枳殼南星。中虛，加參朮香附砂仁。痰血合四物湯，加桃仁紅花。

○泄瀉

五瀉須知溺赤清 五瀉，濡瀉即濕瀉，腸垢即熱瀉，鶩溏即寒瀉，虛瀉，滑瀉。大要熱者，小便赤澁煩渴，腹中熱，穀或不化而色變青黃，或紅赤黑，身能動作，聲響音亮，手足溫。寒者，小便清白不渴，腹中冷，完穀色亦不變，變亦白色，身懶動作，目睛不了了，飲食不下，鼻準甚。暴瀉非陽，久瀉非陰，正如傷寒始寒而終熱也。濕瀉身

重注如傾 濕瀉如水傾下，腸鳴身重，腹不痛。外濕者，胃苓湯、除濕湯，或朮附湯加茯苓。內濕者，白朮芍藥湯、白朮茯苓湯、二白丸。風濕相搏者，麴芎丸。痛甚者，治痛瀉方。

挾風完穀寒急痛 風瀉，惡風自汗

或帶清血即太陰發濕反其所食原物由春傷風暑夏感
冷濕發動故其瀉暴一方長幼相似不止可温濇以致變
痢脹要知四季脾受風濕亦名飧瀉春古薷防湯蒼芎湯
夏二香散秋神术散冬不換金正氣散微汗之稍久者三
白湯麯芎丸帶血虛者胃風湯○寒瀉惡寒身痛腹脹切
痛雷鳴鴨溏清冷完穀不化甚則脾敗服冷理中湯倍加
茯苓厚朴治中湯加砂仁或大巳寒丸又有一種身熱煩
臟冷瀉以熱手按之則緩者四柱散古姜附湯
渴暑分明暑瀉如水須渴尿赤暴瀉實者薷苓湯加黃連
車前子或桂苓甘露飲虛者六和湯清暑益氣
湯有潮熱者柴苓湯升麻葛根湯
日久香連丸黃連阿膠丸來復丹内傷飲食痛且臭食積
痛甚
瀉後痛減臭如抱壞鷄子噫氣作酸須先消克所傷之物
傷冷食者感應丸平胃散加香附砂仁草果山查麥芽傷
熱食及酒者三黃丸加神麯傷酒晨瀉者理中加生姜乾
葛或香茸丸熱者酒蒸黃連丸傷麪者人參養胃湯加蘿
蔔子傷水飲者
五苓散温六丸痞脹不順屬七情七情瀉腹常虛痞欲去
不去去不通泰藿香正

氣散加丁香砂仁良姜或木香匀氣散七氣湯古黄連丸調其氣而瀉自止矣

痰瀉多少火暴速

痰瀉或瀉不瀉或多或少此因痰流肺中以致太腸不固二陳湯加白朮神麹實者海青丸虛者六君子湯○火瀉實火口渴喜冷痛一陣瀉一陣肛門焦痛其來暴速稠粘五苓散去桂加黄連芍藥或黄芩湯加木通六一散兼嘔者加姜汁又火性急或米穀不化者姜汁炒黄連爲丸服虛火氣虛不能泌別水穀者衛生湯陰虛火動不能凝束者三白湯斂之久者升陽丸

虛瀉厥汗面多青

虛瀉困倦無力脾虛飲食所傷有遇飲食即瀉者四君子湯加木香砂仁蓮肉陳糯米爲末砂糖湯調服久者只加升麻白芍或平胃蒜肚丸有停蓄飲食數日乃瀉腹脹者名瀼瀉枳朮丸沒石子丸煩渴或兼嘔者錢氏白朮散參苓白朮散食少腸鳴四肢困倦者升陽除濕湯日止夜瀉者啓脾丸又脾瀉久傳腎爲腸澼經年不愈者調中健脾丸又老人脾胃虛瀉者用吳茱萸鹽水浸透以獖猪臟頭一截洗去脂膜將茱萸入內札兩頭蒸爛搗丸菉豆大毎五十丸米飲下煖膀胱清水道固太腸進飲食

○腎虛色慾所傷泄瀉多足冷久則肉削五鼓臍下絞痛或只纖響溏瀉一次者古茱萸散二神丸四神丸陽虛者三味安腎丸金鎖正元丹養氣丹陰虛者腎氣丸○肝虛忿怒所傷木尅脾土閉戸不束厥而面青當歸厚朴湯或熟料五積散去麻黃汗多者黃芪建中湯○凡瀉脉細皮寒前後瀉利飲食不入是謂五虛不治

滑瀉不禁氣陷脫

瀉久不止太孔如竹筒直出無禁氣陷者升陽補胃湯補中益氣湯加白芍有風者小白朮湯挾熱者訶子散没石子丸或古黃連丸罌粟殼煎湯下氣欲脫者眞人養臟湯加附子或四柱散大斷下丸古薑附丸香茸丸婦人四製香附丸又有大腸滑瀉小便精出者萬全丸

交腸似痢何由名

交腸瀉者大小便易位而出此因氣不循故道清濁混淆所致當分利陰陽使氣順各安其位胃苓湯木香分氣散腎氣丸○似痢非痢寒熱不調之症或熱積於中而以冷物冷藥求之或冷積於中而以熱物熱藥壓之故熱與冷搏而成瀉或澁或溏裏急後重者戊己丸香連丸或理中湯加黃連木香

風宜微發寒溫澁虛補積消

濕滲丹 凡瀉皆兼濕初宜分理中焦滲利下焦久則升舉
表寒勝兼以溫中滑脫不禁然後用藥澁之其間有風勝兼以解
滲滑則升舉隨症變用又不拘於次序與痢大同且補虛
不可純用甘溫太甘則生濕清熱亦不太苦苦則傷脾每
兼淡劑利竅為妙 ○ 抑考難經云胃泄飲食不化色黄脾
泄腹脹嘔逆言瀉也太腸泄食已窘迫色白腸鳴切痛小
腸泄溲而便膿血小腹痛大瘕泄裏急後重數至圊而不
能便莖中痛而溺澁言痢也觀此瀉與痢亦惟膿血與糞
之異除傷寒三陽三陰傳變自利雜病濕熱食積之根皆
責腸胃盖泄瀉瘧痢同由暑月飲食所致輕者便作泄瀉
重者停為瘧痢痰鬱膈膜則為瘧積滯腸胃則為痢有
有分難經五瀉者
不免失之牽強

○吞酸

吞酸吐酸皆濕熱 經云諸嘔吐皆屬於熱又云少陽之勝
嘔酸盖酸者肝木火盛制金不能平木

則肝木自甚爲酸譬之飲食熱則酸但吐酸乃平時津液上升之氣鬱積爲痰火留飲不化釀爲酸水吐出吞酸乃濕熱伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下宿食鬱遏而作其因治一也惟濕多熱多耳濕多則吞而便利熱多則吐而便閉東垣言寒者論其標耳

大要初起宜反折

素有濕熱因外感風寒則內熱愈鬱酸味刺心或即吐出或欲吐不吐胸中無奈或得熱湯暫解蓋風寒鬱在肌表往復則腠理開泄譬之傷寒表熱以麻黄熱藥發表而愈不問外感風寒內傷生冷初起俱宜生薑汁半夏湯或二陳湯加丁香木香肉桂乾薑砂仁薑棗煎服暫與開發此反佐之藥非正治也中病即止如中寒停水者神麯丸上熱寒者三味參萸湯上熱下寒者黄連一兩附子七錢神麯糊丸淡薑湯下

久消食積降火痰

久則鬱熱宜以寒藥調之下之結散熱去則氣自通和於中酸宜素食者恐滯氣也○宿食通用二陳湯或生料平胃散加香附砂仁神麯山查麥芽山梔仁黄連或茯朮丸宿食留飲酸鬱心痛牙齒亦酸者麯朮丸專吐清水者用蒼朮茯苓滑石白朮陳皮水煎服兼嘈雜者保和丸○痰火停食

一日半日腐化酸水吐出黄色或酸心不安通用二陳湯加山査神麴桔梗南星枇杷葉黄連竹茹姜煎臨熟入姜汁一匙調服或九味茱連丸挾瘀血者加四味茱連丸兼嘈雜者清痰丸○通用大便閉者透膈湯大便自利者用六一散去甘加呉茱萸一兩蒸餅丸服

陰虚暮劇須養血

朝食甘美至晡心腹刺酸吐出此血虚火盛宜四物湯加陳皮黄連黄芩桃仁紅花麻仁甘草便閉結者更加大黄氣虚者更合四君子湯

○黄疸

黄疸須知有濕乾

發黄譬如盦麯五疸同歸濕熱蓋濕熱薫蒸血熱土色上行面目延及爪甲身體俱黄黄即疸也乾黄熱勝色黄而明大便燥結濕黄濕勝色黄而晦大便潤利又濕病與黄病相似但濕病在表一身盡痛黄病在裏一身不痛

渇多喘滿治之難

凡疸以十八日為期十日以外入腹喘滿渇多面黒者死要知疸兼雜症最多脾胃虚實更斷厚味可治酒色傷欲口腹者難

汗溺俱黄身體腫

汗出染衣赤黄身痛者曰黄汗因陽明表熱多汗灌汗入水宜桂枝苦酒湯茵陳湯○小溺面目牙齒肢體如金曰黄疸因暴熱用冷水洗浴熱留胃中故食已善饑安卧懶動宜茵陳三物湯加木通瓜蔞仁石膏或單桃根煎湯服之

頭眩懊憹發赤斑食已頭弦腹脹曰穀疸因胃熱大飢過食停滞胸膈宜小柴胡湯加穀芽枳實山梔或穀疸丸紅丸子傷冷食肢厥者四逆湯加茵陳○心胸懊憹欲吐不食腹如水狀足心熱脛滿面發赤斑脈黄鼻齆曰酒疸因大醉當風入水酒毒留於清道初起令病人先含水後以瓜蔕末一字搐鼻吐出黄水次服葛朮湯探吐亦可熱者小柴胡湯加茵陳白朮豆豉乾葛黄連澤瀉便閉者梔豉枳實湯加大黄或酒蒸黄連丸如酒後犯房瘀熱入心成疸者妙香散瘀火入肺

甚則額黒成疸咳嗽見血鉄腥及婦人血崩龍腦雞蘇丸

小腹滿額上黒微汗手足心熱薄暮即發膀胱小便不利曰女勞疸因大熱犯房入水腎虚從脾氣上行虚者四君湯吞元叅子小菟絲子丸熱者古礬硝散滋腎丸

陰經嘔吐陽熱寒諸疸發於陰經必嘔

小半夏湯發於陽經必有寒熱小柴胡湯加山梔虛勞口淡脚軟弱内虛發黄口淡怔忡耳鳴脚軟微寒發熱白濁氣虛四君子湯血虛四物湯合四苓散加茵陳麥門冬氣血俱虛人參養榮湯八味丸如飲食勞役失節中寒生黄者黄芪建中湯理中湯食積者二陳湯加砂仁外感瘀血詳傷寒凡時行感冒及伏暑濕毒未盡蓄熱在内及宿食未消皆能發黄大要時疫瘴痢發黄瘴疸丸風症色黄帶青小柴胡湯加茵陳寒症色黄帶黯理中湯加茵陳青皮枳實無汗者用麻黄三錢酒煎溫服以汗之暑濕症色黄帶赤五苓散加茵陳最妙又瘀血發黄喜狂喜忘便黑詳傷寒治分表裏滲爲妙治疸表症小柴胡湯微汗之表少裏多者茵陳五苓散滲之半表裏者梔子柏皮湯茵陳三物湯一清飲子和之裏急者茵陳湯下之就中尤以滲利爲妙通用五苓散爲主濕多倍茵陳食積加三稜莪朮砂仁神麯熱加芩連草龍膽小便不利加山梔胃弱合平胃散去厚朴加茵陳黄連山梔防已枳實溫中兼補腎與肝疸屬脾胃不可驟用涼藥傷胃輕則

嘔噦重則喘滿又洒疸下之則成黒疸不渇便利者俱宜六君子湯加茵蔯蒼朮山藥以温之甚者小温中丸大温中丸退黄丸若虚損猶宜滋補肝腎真陽之精升而邪火自斂若必用茵蔯強利小便枯竭肝津腎水則疸病幸痊而雀目腫脹又作慎之

○水腫

水腫上下陰陽微陽水多外因渉水冒雨或兼風寒暑氣而見陽症陰水多内因飲水及茶酒過多或飢飽勞役房慾而見陰症陽水先腫上體肩背手膊手三陽經陰水先腫下體腰腹脛胕足三陰經故男從脚下腫起女從頭上腫起者爲逆陰陽微妙如此**濕熱變化總屬脾**人身眞水眞火消化萬物以養生脾病水流爲濕火炎爲熱久則濕熱鬱滯經絡盡皆濁腐之氣津液與血亦化爲水初起目下微腫如卧蠶及至水溢皮外則爲膚脹流下焦則爲胕腫手按隨手而起如裹水之狀以指畫之成字者名燥水不成字者名濕水有下

撥之作水聲者乃氣虛不能宣洩故成水脹下注腎經陰脬腫腎主水也惟脾病則不化飲食滋真水非惟腎精損削而滋熱下注陰脬獨腫者有之甚則泛濫遍體無歸必土實而後足以收攝邪水腎氣歸元

上升氣喘肺孤危金生水也惟脾病則肺金失養非惟肺氣孤危而失降下之令滲道不通且濕熱濁氣上升爲喘爲咳必土實而後肺金清肅以滋化陽源或曰獨無寒濕者乎寒則土堅水清閉有亦更易治

水熱渴二便閉汗下分消要得宜經曰諸脬腫疼酸皆屬於火又曰結陽肢腫是也○治與水症濕症大同大法腰已上腫宜汗腰已下腫宜下表症喘咳小青龍湯越婢湯古麻井湯桂枝苦酒湯裏症腹腫脹硬十棗湯澤瀉湯澤瀉牡蠣湯導水丸三花神佑丸濬川丸布海丸然症雖可下又當權其輕重若年衰久病及虛者黃米丸初起只宜上下分消其濕五苓散用桂枝合六一散加橘皮木香檳榔生薑煎服或卑山梔丸木香白朮煎湯下兼疸者茵蔯五苓散滲之

陰水身涼大便利補中行濕或升

提經曰陰蓄於內求氣脹滿是也○治宜補脾土以復運化之常清心火降肺金俾肝木有制而滲道又且開通此補中行濕兼金盛而有濕熱者最宜甚中寒者溫補則氣發而小便自通氣陷者升提則陽與舉而陰自降故曰行濕非五苓神術之謂也○補中氣六君子湯加木香寫者參苓白朮散升陽除濕防風湯嘔者赤茯苓湯中寒者玄武湯實脾散挾食積者除皮丸千金養脾丸挾濕熱者中滿分消湯丸濕甚者退黃丹○虛甚氣陷口無味者六君子湯加升麻柴胡以提之復元丹切忌淡滲○腎虛腰重脚腫濕熱者加味八味丸滋腎丸陽虛小便不利者古沉附湯二便俱利者朮附湯復元丹

陰多久病或產後

久病喘急瘡痢或誤服涼藥以致腫者危症也俱宜補脾為主大䐜挾喘者分氣紫蘇飲五皮散葶藶丸久痢加味八味丸久瘧退黃丸○產後腫必大補氣血使水自降八物湯加蒼朮陳皮半夏香附有熱加麥門冬黃芩氣不順加木香砂仁懐胎氣遏水道腫者去半夏加紫蘇大腹皮飲食無阻者雖不藥而既產自消矣

陽兼食毒與瘡痍

食積香平丸枳朮丸因酒

小蘿皂丸〇飲毒水而腫者名水蠱渋雄丸不伏水土者
胃苓湯〇膿瘡服藥愈後發腫者敗毒散便閉升麻和氣飲
乾瘡洗浴水氣入腹者赤小豆湯瘡久倦怠嗜臥腫者五
苓散加橘皮木香檳榔滑石甘草枳殼大腹皮砂仁姜煎
溫服

風腫走注皮麻木

陽水陰水腫外又有風腫氣腫血腫
惟腸覃石瘕乃婦人病也〇風腫即
痛風腫者腫面多風熱腫脚多風濕關脉浮洪弦者風熱
濕三氣鬱而為腫因脾土不足木火太盛胃中純是風氣
所以清氣不升腹作䐜脹濁氣不降大便閉澁經白中滿
瀉之於內者是也外症走注疼痛面皮麄麻木不仁先服
三和散次服小續命湯大便閉去附子加檳榔牽牛日久
者金井風從汗散故也虛弱不能汗者四君子湯加升麻
柴胡蒼朮防風汗
參耆防己黃芪湯

氣腫隨氣消長之

七情停淤鬱為濕熱
脾肺俱病四肢瘦削
腹脇脹滿與水氣相似但以手按之成凹不即起者濕也
按之皮厚不成凹者氣也六君子湯加木香木通喘者木
香流氣飲大便閉者三和散六磨湯木香檳榔丸小便閉
者分心氣飲脹滿者四炒枳殼丸濕者单香附丸挾痰腹

脹痛者加味枳朮湯、控涎丹。

瘀血之腫如何識　皮間赤縷血痕見

四物湯加桃仁紅花、或續斷飲加味、八味丸。婦人經閉敗血腫者、腎氣丸加紅花、或紅礬丸。詳婦人經候。

莖囊又有陰陽候

玉莖與陰囊、神縮瘀強、乃身中陰陽之機。有陽火玉莖腫脹、徵裂不休者、柴青瀉肝湯。濕熱下流者、四苓散加山梔木通金鈴子。莖囊腫大通明者、木香流氣飲加木通、煎吞青木香丸。暴風客熱、陰挺腫脹者、龍膽瀉肝湯。膀胱熱甚、囊腫二便不通者、三白散、八正散。腫痛者用小茴、金蝎、穿山甲、木香等分為末、每二錢空心酒下。有陰寒濕腫痿弱者、五苓散加茴香、或八味丸。腎大如斗者茘枝散。上熱下虛、玉莖腫痛者、清心蓮子飲。陰腫大如升核者、用馬鞭草搗爛塗之、或乾地龍為末、鷄子清調敷。囊軟者可治。婦人陰腫便秘、枳橘熨。

通治忌甘與刺皮

凡陽术宜辛寒散結行氣、苦寒瀉火燥濕。陰术宜苦溫燥脾、或辛熱導氣。極忌甘藥助濕作痛。尤忌針刺犯之、流水而死。○通用二陳湯去甘草、加蒼朮白朮為君、佐以猪苓澤瀉山梔消濕熱、麥門冬黃芩為使、清肺

制肝腹脹加厚朴瀉加肉豆蔻訶子喘急加桑白皮杏仁
氣壅加香附食積加山查麥芽腸水便閉加甘遂少許陰
水氣弱加人參風腫加羌活防風白芷夏月加香薷寒加
姜桂氣腫加蘿蔔子枳殼血加歸芍痰加貝母上腫加紫
蘇下腫加防已木瓜陰囊腫加小茴木香外腎茄不引臍
痛加巴戟○又太陽腫症加藁本李赤小豆少陽加芫花旋
黃木通陽明加茯苓枳日太陰加甘遂葶藶少陰加澤瀉
連翹巴戟厥陰加大戟吳茱萸此推廣古法不可妄用蓋甘
遂大戟芫花損氣破血巴豆損腎陰氣輕粉傷齒毒留腸
胃土損却奪消而後腫復之○凡先腫腹而後散於四肢
者可治先腫四肢而後歸於腹者難治若肌肉崩潰足脛
流水脣黑耳焦缺盆平臍凸背平手足掌平肉硬腹多青
筋大便滑泄者不治又面黑者肝死兩手無紋者心
死臍凸者脾死兩肩凸者肺死下注腳腫者腎死

○鼓脹（與喘參看）

鼓脹虛歟實則堅（鼓脹中空外堅有似於鼓又曰蠱者若虫侵蝕之義虛脹陰寒為邪吐利不食）

時脹時減按之則陷而軟實脹身熱咽乾常脹
内痛按之不陷而硬大槩肥人氣虚多寒濕瘦人血虚多
濕熱
都縁脾濕少運布
脾居中能升心肺之陽降肝腎之陰今内傷外感脾陰受傷痰飲結聚飲
食之精華不能傳布上歸於肺下注膀胱故濁氣在下化
為血痰鬱久為熱熱化成濕濕熱相搏遂成鼓脹或在臓
腑之外或在榮衛之外或在胷脇或在
煩喘嘔瀉腰脇疼
皮膚鮮否臓腑見症亦總歸於脾也
胃痛癃閉小腹墜
心脹煩心肝脹脇痛脾脹善嘔噦肺脹咳喘而腎脹腰痛胃脹胃脘痛大腸脹腸
鳴飧泄小腸脹小腹引腰痛膀胱脹小
便癃閉三焦脹氣滿皮膚膽脹口苦
外感寒鬱為裏邪
外感風寒傳至陽明裏分大實大痛者承氣湯古今方之
脹已者是也○尋常感風脹者升麻葛根湯加蒼术或升
麻胃風湯感寒脹者不換金正氣散加檳榔枳殻乾姜風
寒兩感脹者五積散暑脹二便不利者香薷散加滑石枳
殻黄連二便利者六和湯濕脹腰
内傷氣滯閉且利
七情鬱結
重或嘔者除濕湯瀉者三白湯

氣道升降失常腹脹大而四肢多瘦四七湯七氣湯四磨枳殼丸因怒傷肝膽脾者疼痛喘急平肝飲子甚者當歸龍薈丸虚者爲除脹丸因怒傷肝乘肺傳大腸者腹鳴氣走有聲二便或閉或瀉六君子湯加蘇子大腹皮木香草菓厚朴枳實便閉者三和散四磨湯憂思氣鬱者木香化滯湯木香檳榔丸溫膽湯退熱清氣湯恐傷腎精氣怯却不上升而下焦脹者補中益氣湯加木香檳榔故紙

食脹有熱亦有寒因食肉果菜不化曰食脹○初起多寒濕自利不食者胃苓湯加山查麥芽或人參養胃湯加香附砂仁甚者治中湯加丁香或厚朴附子二味煎服○久則濕熱乘脾大便乾燥者保和丸傷肉者黃連阿魏等分醋浸蒸餅爲丸或三補丸用香附山查煎湯下傷雜果者古桂香丸或韮湯探吐膏粱厚味大便閉者大承氣湯加桂或厚朴湯積熱者牽牛丸虚者木香檳榔丸滋腎丸

穀脹痞滿心嘈醋因穀食不化曰穀脹朝傷盛飽食暮傷飢不能食者大異香散五膈寬中散○濕熱者古連丸清膈蒼莎丸俱穀芽煎湯下或雞矢醴散最效

水積善飲癖不眠

蟲積脹腹痛善啖茶塩之物千金散雷公丸小兒史君子
丸大人虛者木香檳榔丸靈檳散化虫丸 ○ 積塊癥瘕心
腹堅硬咳嗽不眠者廣朮潰堅湯保
安丸紅丸子輕者枳朮丸鼈甲丸

水脹漉々血硬痰

因停
水飲茶酒不散曰水脹腸中漉漉有聲怔忡喘急二陳湯
加桔梗檳榔消飲丸酒脹桂苓甘露飲 ○ 瘀血脹便黒多
跌撲及産後所致人參
芎歸湯散血消腫湯

一般中満症稍輕

俗云倒飽有氣
虛者六君子湯
加黄芪厚朴木香食積加山査麥芽痰濕熱加黄連青皮
白芍木香清氣陥者木香順氣湯有血虛者四物湯加白
朮木通厚朴濕熱加芩連有食滯者平胃散加山査麥
芽或枳朮丸 凡虛脹及久病瘧痢脹者俱依此分氣血調
治

補中行濕法相兼

凡脹初起是氣久則成水治比水腫
更難蓋水腫飲食如常鼓脹飲食不
及常病根深固必三五年而後成治腫惟補中行濕足矣
治脹必補中行濕兼以消積更斷塩醤音楽妄想不責速
效乃可萬全 若單腹腫大而四肢極痩者名蜘蛛蠱古方
雖有八物湯去地黄倍參朮加黄連厚朴及四柱散諸蠱

保命用蝦蟆煮肚法然此皆脾氣虚極本經自病更無相生相制乃真臟病也不治○補中六君子湯去甘草加大腹皮厚朴為君佐以澤瀉利湿黄芩麦門冬制肝朝寛暮急為血虚去参合四物湯朝急暮寛為氣虚倍参朮朝暮皆急為血氣倶虚合八物湯肥人多湿合平胃散痩人多火加香附黄連寒加附子厚朴熱加大黄食脹加砂仁神麴痰脹倍半夏加檳榔猪苓瘀血加桃仁五霊脂積聚堅硬加三稜莪朮大怒加蘆薈山梔氣脹及虫積加木香檳榔氣下陥加升麻柴胡凡議下須脉實人盛發之堅者先與補藥次服疏導後又補之否則徒快一時其脹愈甚經云臓寒生満脹寒脹恒多熱脹恒少○通用中満分消丸古龍虎丹寛中進脾丸禹餘粮丸単鶏矢醴散内消散外敷神膏

赤白濁

赤白濁同男女皆因湿熱脾胃湿熱中焦不清濁氣滲入膀胱為濁如夏月天熱則萬木流津

○赤者血分湿熱甚心與小腸主之導赤散四物二陳湯加樗白皮青黛滑石○白者氣分湿熱微肺與大腸主之

清心蓮子飲或五積散合四君子湯

濕痰濕火理一同

肥人多濕痰二陳湯加蒼朮白朮赤濁加白芍氣虚加參芪傷暑加澤瀉麥門冬人參傷風加防風挾寒加姜桂甚加附子有熱加知母黃柏山梔或星半丸粉丸因七情生痰者四七湯○瘦人多濕火加味逍遙散四物湯加知母黃柏或真珠粉丸樗柏丸虚挾痰火腎氣丸補陰丸不可純寒藥傷血亦不可純熱藥助火蓋寒則堅凝熱則流通俱宜清上固下

間有虚勞下部論

思慮勞心虚者妙香散七味溫膽湯金蓮丸房慾傷腎虚者萆薢分清飲小菟絲子丸腎氣丸八味丸心腎俱虚無火者還少丹虚冷小腹痛不可忍者酒煮當歸丸

久則升提斂胃宜

土燥朮
清思朮

傷脾精生於穀故久則宜升胃補脾二陳湯加升麻柴胡以升胃氣素有痰火恐升動痰火留滯者再加枳殼香附神麯白朮或用此吐以提之如虚勞者補中益氣湯脾濕不斂者蒼朮難名丹四炒固真丹白朮膏戚喜丸久甚古龍膶丸石蓮散遠志丸

